

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# PROLUBE®

## Augentropfen

Tränenersatzmittel zur Befeuchtung und Benetzung des Auges

### Was sind Prolube® Augentropfen?

**Prolube®** Augentropfen sind eine sterile, wässrige, isotone, leicht viskose Lösung.

**Prolube®** Augentropfen befeuchten und benetzen das Auge, ein angenehmer, samtig weicher Film sorgt für unmittelbare Erleichterung.

### Was enthalten Prolube® Augentropfen?

**Prolube®** Augentropfen enthalten 4,3 mg/ml Hydroxypropylmethylcellulose (Hypromellose), Glukose, Glycin, Propylenglykol, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, 0,05 mg/ml Benzalkoniumchlorid, gereinigtes Wasser.

### Welche Funktion haben Prolube® Augentropfen?

Symptome des Trockenen Auges wie Reizungen, müde Augen, Brennen, Jucken oder Fremdkörpergefühl treten auf, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten und damit zu schützen.

**Prolube®** Augentropfen sind ein Tränenersatzmittel. Die in **Prolube®** Augentropfen enthaltene Hypromellose ist ein seit Langem bewährter Gelbildner, der sich wie ein Film über die Horn- und Bindehaut legt.

### Anwendungsgebiete – Wann sollen Sie Prolube® Augentropfen anwenden?

**Prolube®** Augentropfen befeuchten und benetzen das Auge bei leichten bis mittelschweren Formen des Trockenen Auges mit Beschwerden wie Augenreizungen, Brennen oder Jucken, Fremdkörpergefühl, müde Augen oder subjektives Trockenheitsgefühl.

### Dosierung und Art der Anwendung – Wie und wie oft sollen Sie Prolube® Augentropfen anwenden?

Entfernen Sie vor der ersten Anwendung den Originalitätsverschluss.

Tropfen Sie je nach Bedarf mehrmals täglich (bis zu 6-mal) 1 - 2 Tropfen **Prolube®** Augentropfen in den Bindehautsack des Auges ein.

Um Verunreinigungen der Lösung wie z.B. durch Krankheitserreger vorzubeugen, berühren Sie weder das Auge noch andere Oberflächen mit der Pipettenspitze. Setzen Sie sofort nach der Anwendung den Flaschenverschluss wieder auf und verschließen Sie die Flasche.

Sie können **Prolube®** Augentropfen unter Beachtung der untenstehenden Warnhinweise zur sicheren Anwendung auch über einen längeren Zeitraum (bis zu 4 Wochen) anwenden. Eine darüber hinausgehende Langzeitanwendung wird nicht empfohlen, da es zu Augenreizungen kommen kann (siehe auch "Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung").

### Wann sollen Sie Prolube® Augentropfen nicht anwenden?

Wenden Sie **Prolube®** Augentropfen nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Präparates an.

## Mögliche Nebenwirkungen/Wechselwirkungen

**Prolube**® Augentropfen können nach dem Eintropfen aufgrund der erhöhten Viskosität der Lösung zu vorübergehendem verschwommenen Sehen führen (siehe auch "Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung").

In seltenen Fällen wurde von einem vorübergehenden Brennen nach dem Eintropfen berichtet. Wechselwirkungen von **Prolube**® Augentropfen mit Arzneimitteln sind nicht bekannt. Die gleichzeitige Anwendung am Auge sollte in jedem Fall erst *nach Rücksprache mit dem Arzt* erfolgen.

## Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

- Verwenden Sie den Inhalt der Flasche nicht, wenn vor dem ersten Anbrechen der Originalitätsverschluss am Flaschenhals beschädigt ist, da in diesem Fall die Sterilität der Lösung möglicherweise nicht mehr gegeben ist.
- Aus hygienischen Gründen soll eine Flasche nur von ein und derselben Person verwendet werden um die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden.
- **Prolube**® Augentropfen enthalten das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kann Reizungen am Auge verursachen. Die Anwendung von **Prolube**® Augentropfen wird daher nicht empfohlen bei schweren Formen des Trockenen Auges, bei denen sehr häufiges Eintropfen erforderlich ist, oder für den Langzeitgebrauch (z.B. wenn Sie an Grünem Star (Glaukom) leiden).
- Benzalkoniumchlorid kann Verfärbungen weicher Kontaktlinsen verursachen. Wenden Sie die Augentropfen nicht an, während Sie Kontaktlinsen tragen. Warten Sie nach der Anwendung der Augentropfen mindestens 15 Minuten, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Die Anwendung von **Prolube**® Augentropfen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird nicht empfohlen, da entsprechende Daten zur Sicherheit bei der Anwendung in dieser Altersgruppe nicht zur Verfügung stehen.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor der Anwendung von **Prolube**® Augentropfen Ihren Arzt um Rat.
- Wenn Sie nach dem Eintropfen verschwommen sehen, warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug lenken oder Maschinen bedienen.
- **Wenn Ihre Beschwerden länger als eine Woche anhalten oder sich verschlechtern, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.**

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**


**Packungsgröße:** 10 ml

## Haltbarkeit

Siehe auf der Packung angegebenes Verfalldatum.  
Nach dem ersten Öffnen der Flasche nicht länger als 4 Wochen verwenden.

## Lagerungshinweise

 <sup>25°C</sup> Nicht über 25 °C lagern.  Vor Licht geschützt aufbewahren.

 **Hersteller:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH,  
Leystraße 129, 1200 Wien

 0123

**Vertrieb:** SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien

 **LOT** Chargenbezeichnung des Herstellers

 Haltbarkeitsdatum

 **STERILE** A sterilisiert durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken

 **i** Gebrauchsanweisung beachten!

Stand der Information: Juni 2020