

und Haut, In diesen Fällen müssen Sie de Therapie söfar beenden und einen Azzt konsulteren. Sie dürfen diese Beschwerden NICHT mit Schmerzmitteln oder Fiebersenken einer Informatier in Schutzen der Schwerden Azzteinmiteln behänden.

Psycholische Redictioner und Depressionen.

Ere Verschlechterung von Entzündungen, de mit infektionen in Zusammenhang stehen [z.B. Schutzen zu sich weichteren der Schwisteren der Fazziel in Züsammenhang aben mit mit infektionen in Zusammenhang stehen [z.B. Schwerzel auf Schwerzel zu sich weitheren der Anwendung von Nurolen ragiot verschlieren, müssen Sie unverzüglich einen Azzi betei Visaktion und in Schwerzel zu sich weitheren der Anwendung von Nurolen ragiot verschlieren, müssen Sie unverzüglich einen Azzi betei Visaktion, un untersschen zu issen, ob ein Bederif für eine onti- miektigse Die schwerden einer rosepischschen Mehrnignis im Nickteinsrelleite, Kapkfungeren Freizen der Wasstelleiten wird der Anwendung von Nurolen ragion werterschein einer September der Schwerzel einer von Spickstellen Mehrnignis im Nickteinsrelleite, Kapkfungeren jüseleit, ferschwerden einer rosepischschein Mehrnignis im Nickteinsrelleite Performer von Hautenschlichen berichter Spiration, noxische epidemale Nektralyse/Jyell-Syndrom).

Eschwerze olgsenen und Beneenpflichen Kondokteren Sie solort filmen Azzi, wenn desse Beschwerden einer zespischschein Mehrnignis mit Nichteren Spiration und Beine Azzi wenn desse Beschwerden einer zespischschein Werden Spiration und Beine Programe und Benachfürgen von Asthma und Bronchosposmen.

Schwerze olgsennen Übeerenpflichlichkeitsredkionen.

Verschlechterung von Asthma und Bronchosposmen.

Schwerze olgsennen Ubeerenpflichlichkeitsredkionen.

Verschlechterung von Asthma und Bronchosposmen.

Erstinden ger Form der weite Puliptier Regischen Puliptier Porm der verschlichte Puliptier Porm der verschlichten kann und den öher Begleiten Blüsen, die sich in erster Linie ouf der Nurolen ragid den Om Wielchapseln einflag er Prodressingen verschweiten kann.

Arzeinmitel wie Nurole

BENDEN SIE DIE EINNAHME dieses Arzneimittels und suchen Sie sofort
medizinische Hilfe, wenn Sie eine der folgenden Beschwerden entwickeh:

- Arzeichen einer Dormblung wie starke Boachschnerzen, skwarzze, berfürbene Stülbe,
Erberben von Blu doer dunken leichen, die wie Kaffesstiz aussehen.

- Arzeichen sehr selhener ledoch enrater dilergischen Redictionen wie Verschlechterung von
Ashmo, ungeklärte keuchende Kurzatnigkeit, Schwellungen von Gesicht, Zunge oder Hals,
Atemnot, hetzrasen, Bludandcabfall, der zu Schock Kilnft. Diese können sogar bei der ersten
Anwendung dieses Arzeinnitels aufreten.

Blasenbildung oder Abblättem der Haut
Nebenwirkungen verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Aponheker. Dies gilt auch für Webenwirkungen bemerken oder wenn sich
Nebenwirkungen verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Aponheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen bemerken oder wenn sich
Nebenwirkungen verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, Buchschinerzen, Übelkeit und
Verdouungsstörungen, Erbechen, Bichungen (Flauhenz), Durchfall, Versupfung, und leicher
Bluvenlats in Magen und Voder Durm der in Ausnahmeßlein eine Andmie verursachen kann.

Gelegentlich (Kann bis zu 1 von 10 Behandelhen betreffen)

- Magen – Oder Darmgeschwire, manchmal mit Blutungen und Durchbruch (Perforation),
Erizufingen des Zentrolnervensystems wie Kopischmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit,
Erreghteit/Uhruhe, Reizbarkeit oder Müdigkeit.

- Seltstörung der Nurdschleimhout (luzertine Stoneritis), Magenentzundung (Gastris),
Verschlechterung einer Coliitis und Machus Gronerite.

- Alergische Recktionen wie Hautausschläge, Juckeiz und Ashma-Athacken. Sie müssen die
Einnahme von Nurden ropid beenden und solor Ihren Azzi informieren.

- Alergische Recktionen wie Hautausschläge, Juckeiz und Ashma-Athacken. Sie müssen die
en geschräckes Härvermögen

- Farbundungen (Ödeme), Bulbrochdunck (Hypertoniel und Herzisstiffizienz wurden in
Eussammenhenn mit der Behandung mit nicht-seroidelnen

Nurofen rapid 400 mg Weichkapseh enthalnen 36.66 mg Sorbiol pro
Weichcapsel, Bien eehmen Sie Nurden rapid 400 mg Weichkapsel enthalnen between the Weichcapsel Brown Weichcaps

Dies gilt insbesondere für die Einnahme folgender Arzneimittel:
andere Entzindungshemmer und Schmerzmittel
(NSAR), einschließlich selektive Cyclooxygenase-2
Hemmer

rs zonstigen Anzeichen einer Allergie sollten Sie die Behandlung in Nurolen ragde einste sich unverzüglich in medizinische Behandlung begeben, da dies die ersten Anzeichen er schwerwiegenden Haufreaktion sein können. Siehe Abschnitt 4.

schwerwiegenden Haufreaktion sein können. Siehe Abschnitt 4.

schwerwiegenden Haufreaktion sein können Siehe Abschnitt 4.

schwerwiegenden Haufreaktion sein können können mit einem geringfügig Sihlend Nisiko für einen Herzanfall oder Schlagarfal einhergehen, insbesondere bei wendung in hohen Dosen. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis oder angelungsdauer.

With the control of the state o

können zu hohen Kölumwesten in Blut

Mehrberad (ein Azraeinhie) gegen Keels und

die Wikung von Mehoneval kom verstächt sein

Reumachmeil

Zaboude (ein Azraeinhie) zur Behandlung von Mehoneval kom verstächt sein

Reumachmeil

Zaboude (ein Azraeinhie) zur Behandlung von Mehoneval kom verstächt sein

Reumachmeil

Zaboude (ein Azraeinhie) zur Behandlung von Bei Hilf positiven Hänspolitie Peierten ("Bilber")

Hilf ADS)

Mehnhorten (Eine Azraeinhie) zur Behandlung von Mehoneval kom verstächt sein

Kommograschiere rogewerstell)

Azenhandspolitiene (gewenstell)

Azenhandspolitienen (gewenstell)

Azenhandspolitienen (gewenstell)

Azenhandspolitienen (gewenstell)

Azenhandspolitienen (gewenstell)

Azenhandspolitienen (gewenst

goxin (gegen Herzinsuffzienz)

die Wirkung von Digoxin kann verstärkt sein uccoorficoide (Arzneimitte), die Cortison oder vortson-ähnliche Subsanzen enthalten)

srinnungshemmer können das Risiko für Magen/DarmGeschwüre de Blutungen erhöhen

können das Risiko für Magen/DarmGeschwüre de Blutungen erhöhen

die Wirkung von Phenyloin kann verstärkt sein de Wirkung von Phenyloin kann

Information für Anwender

ARAPID

AND Weichkarpsein

Information für Anwender

And Dong Weichkarpsein

Information für Anwender

Information für Anwender

And Dong Weichkarpsein

Information für Anwender

And Dong Weichkarpsein

Information and Jagendahn mit einem Gewicht do Storg

Lane für de genem bedangsbege sogsäffig durch, berore Stem interferender sich seiner Vertrechten Stemation and Jagendahn mit einem Gewicht do Storg

Lane für de genem bedangsbege sogsäffig durch, berore Stem interferender des Vertrechten Stemation and Jagendahn mit einem Gewicht do Storg

Lane für de genem bedangsbege sogsäffig durch, berore Stem interferender des Vertrechten und Jagendahn mit einem Gewicht do Storg

Lane für de genem bedangsbege sogsäffig durch, berore Stem interferender des Vertrechten und Stematiche S