



28
Acid.
benzoicum
Komplex
Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 ml Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acid. benzoicum e resina D3 Dil., Berberis D4 Dil., Millefolium D3 Dil., Pareira brava D4 Dil. Petroselinum D3 Dil., Sarsaparilla D4 Dil., Verbascum D3 Dil., Asparagus officinalis D3 Dil., Chimaphila umbellata D2 Dil., Balsamum copaivae (HAB 1934) D3 Dil. (HAB, Vorschr. 5a), Populus tremuloides D3 Dil. je 0,9091 ml
Dieses Präparat enthält 63,4 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C lagern. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 483.00.00 Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
28 Acid. benzoicum Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 28 Acid. benzoicum Komplex nicht einnehmen? 28 Acid. benzoicum Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Überempfindlichkeit gegen Schafgarbe (Achillea millefolium), gegen andere Korbblütler oder gegen Salicylate nicht

angewendet werden.
Wann dürfen Sie 28 Acid. benzoicum Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll 28 Acid. benzoicum Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft beachten? 28 Acid. benzoicum Komplex soll in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 63,4 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,5 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,25 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen sowie bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Die Akutdosierung sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
1 ml entspricht etwa 25 Tropfen
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite. Nicht über 25 °C lagern.
Stand der Information: April 2016