Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

Antifungol® HEXAL® Heilpaste

Zusammensetzung
Arzneilich wirksame Bestandteile:
1 g Paste zur Anwendung auf der Haut enthält 0,01 g Clotrimazol und 0,15 g Zinkoxid.

Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Hexadecylpalmitat, Octyldodecanol (Ph.Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt
Originalpackungen mit 25 g (N1) und 50 g (N2) Paste zur Anwendung auf der Haut

Antifungol® HEXAL® Heilpaste ist ein Mittel zur Behandlung von Pilzerkrankungen der Haut.

HEXAL AG
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen
Tel.: (08024) 908-0, Fax: (08024) 908-1290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller
Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete
Pilzinfektionen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere wie Malassezia furfur, insbesondere im Bereich von Hautfalten (z. B. zwischen den Zehen, in der Leistenbeuge).

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie Antifungol® HEXAL® Heilpaste nicht anwenden?
Sie dürfen Antifungol® HEXAL® Heilpaste nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol, Zinkoxid oder einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Als Ergebnis einer Studie an Schwangeren ergibt sich der begründete Verdacht, dass Clotrimazol (Imidazole) bei vaginaler Anwendung im 1. Drittel der Schwangerschaft die Fehlgeburtsrate erhöhen kann. Entsprechende Untersuchungen für das 2. und 3. Drittel liegen nicht vor. Die Anwendung von Clotrimazol sollte daher mit der gebotenen Vorsicht erfolgen, da Studien, die ein Fehlbildungsrisiko für den Menschen bei vaginaler Anwendung und Anwendung auf der Haut ausschließen, nicht vorliegen.

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit Clotrimazol zu vermeiden, sollte Antifungol® HEXAL® Heilpaste von Stillenden nicht im Brustbereich angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise
Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?
Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen
Welche Wechselwirkungen zwischen Antifungol® HEXAL® Heilpaste und anderen Arzneimitteln sind zu beachten?
Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit anderer Mittel zur Behandlung von Pilzerkrankungen wie Amphotericin und andere Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Vor der Anwendung anderer auf der Haut anzuwendender Mittel ist Antifungol® HEXAL® Heilpaste vollständig zu entfernen, da deren Wirksamkeit eingeschränkt werden kann.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Antifungol® HEXAL® Heilpaste nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Antifungol® HEXAL® Heilpaste sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel von und wie oft sollten Sie Antifungol® HEXAL® Heilpaste anwenden?
Tragen Sie die Paste zur Anwendung auf der Haut 2-mal täglich, morgens und abends, auf die erkrankten Hautstellen auf.

Wie sollten Sie Antifungol® HEXAL® Heilpaste anwenden?
Tragen Sie die Paste zur Anwendung auf der Haut dünn auf die erkrankten Hautstellen auf.

Nach jedem Waschen sollten Sie die Zehenzwischenräume und Hautfalten gründlich abtrocknen.

Wie lange sollten Sie Antifungol® HEXAL® Heilpaste anwenden?
Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Ausmaß und Lokalisation der Erkrankung. Sollte nach 2 Wochen keine Besserung erreicht sein, sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen.

Bei komplizierten Pilzinfektionen kann eine längere Behandlungsdauer erforderlich sein.

Die Behandlung sollte bis zum Verschwinden der positiven Pilzkulturen durchgeführt werden, mindestens jedoch noch 14 Tage nach Abklingen der Beschwerden. Zwischen dem letzten Auftragen und dem Anlegen einer Pilz-

kultur sollte ein therapiefreies Intervall von 3-4 Tagen liegen, damit eventuell Wirkstoffreste die Kultur nicht stören.

In der Regel beträgt die Behandlungsdauer 2 Wochen, kann aber bis zu 4 Wochen ausgedehnt werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei nicht ausreichend langer Behandlung kann sich die Pilzerkrankung erneut ausbreiten oder wieder auftreten (Rückfall).

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Antifungol® HEXAL® Heilpaste auftreten?

Gelegentlich können Hautirritationen mit Rötung, Stechen und Brennen vorkommen.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile können allergische Reaktionen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung und dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Antifungol® HEXAL® Heilpaste aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch des Behältnisses ist die Paste zur Anwendung auf der Haut bis zu 4 Wochen haltbar.

Stand der Information

Juli 2004

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

574705