

# Gebrauchsinformation

Wichtige Information, bitte aufmerksam lesen!

## Pharmazeutischer Unternehmer:

### CT-Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42a

13407 Berlin

Telefon: 0 30/40 90 08-0

Telefax: 0 30/40 90 08-21

www.ct-arzneimittel.de

## Laxagetten<sup>®</sup>-CT Abführtabletten



Wirkstoff: Bisacodyl

### Wirksamer Bestandteil

1 magensaftresistente Tablette enthält Bisacodyl 5 mg

### Weitere Bestandteile

Lactose-Monohydrat, Cellulosepulver, Maisstärke, Macrogol 8000, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Copovidon, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Triethylcitrat, Poly(ethylacrylat-co-methacrylsäure) (1:1).

### Anwendungsgebiete

Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern.

### Gegenanzeigen

Bisacodyl darf nicht angewendet werden bei Darmverschuß. Es sollte nicht angewendet werden bei akut-entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Sollte Ihnen bekannt sein, dass bei Ihnen eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckerarten (z. B. Lactose, Galactose oder Glucose) vorliegt, halten Sie bitte vor der Einnahme Rücksprache mit Ihrem Arzt.

### Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind bei kurzfristiger Einnahme selten.

Bei längerdauernder oder hochdosierter Anwendung kommt es häufig zum Verlust von Kalium und anderen Elektrolyten. Dies kann zu Störungen der

Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln und Nebennierenrindenhormon. Die Empfindlichkeit gegenüber Herzglykosiden wird verstärkt.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Bisacodyl kann den Kaliumverlust durch andere Arzneimittel (z. B. harntreibende Mittel) verstärken.

### **Dosierung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsenen und Kinder über sechs Jahren abends je nach Bedarf 1 bis 2 Tabletten ein.

Die Dosis sollte 0,3 mg Bisacodyl pro Kilogramm Körpermasse nicht überschreiten. Der Wirkungseintritt erfolgt nach 6 bis 10 Stunden.

### **Dauer der Anwendung**

Eine längere Anwendung von Bisacodyl sollte nicht ohne ärztliche Anweisung erfolgen. Jede über eine kurzdauernde Anwendung hinausgehende Einnahme von Bisacodyl führt zu einer Verstärkung der Darmträgheit.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Vor Feuchtigkeit schützen!

**Arzneimittel! Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

### **Darreichungsform und Packungsgrößen**

Originalpackung mit 30 magensaftresistenten Tabletten

Originalpackung mit 100 magensaftresistenten Tabletten

Stand der Information

Oktober 2004

**CT-Arzneimittel wünscht Ihnen gute Besserung**