

* 2 4 3 0 1 9 1 0 *

144 Ledum Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung: 10 g (= 10,98 ml) Mischung enthalten:
 Arzneilich wirksame Bestandteile: Ledum D4 Dil., Urtica D2 Dil.,
 Guaiacum D4 Dil., Kalmia D3 Dil., Arnica D4 Dil., Rhus toxicodendron
 D4 Dil., Ruta D2 Dil., Gnaphalium polycephalum (HAB 1934) D3 Dil.
 (HAB, Vorschr. 3a), Stillingia sylvatica (HAB 1934) D4 Dil. [HAB,
 Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)], Thuja D3 Dil., Oleum
 Terebinthinae (HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 5a, D1 mit Ethanol
 86 % (m/m), D4 mit Ethanol 62 % (m/m)], Viola tricolor D2 Dil. je
 0,8333 g. Dieses Präparat enthält 59,3 Vol.-% Alkohol.
 Packungsbeilage beachten!
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
 therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
 Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
 Nicht über 25° C aufbewahren.
 Reg.-Nr.: 2512445.00.00 Apothekenpflichtig Inhalt: 50 ml
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
144 Ledum Komplex
 Homöopathisches Arzneimittel
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
 1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
 Angabe einer therapeutischen Indikation.
 Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
 Wann dürfen Sie 144 Ledum Komplex nicht einnehmen?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 144 Ledum Komplex bei
 Alkoholkranken nicht angewendet werden.
 Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arnika oder
 andere Korbblütler, Terpentin sowie

Giftsumachgewächse soll dieses Arzneimittel nicht
 angewendet werden.
 Wann dürfen Sie 144 Ledum Komplex erst nach
 Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
 Wegen des Alkoholgehaltes soll 144 Ledum Komplex bei
 Leberkranken, Epileptikern und Personen mit
 organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach
 Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
 Warnhinweise:**
 Warnhinweis:
 Dieses Arzneimittel enthält 59,3 Vol.-% Alkohol.
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung
 werden bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.
 Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
 Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken

oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und
 Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann
 beeinträchtigt oder verstärkt werden.
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
 beachten?
 Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur
 Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit
 vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache
 mit dem Arzt angewendet werden.
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
 Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
 keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
 soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
 angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen
 vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel
 Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist
 die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen können – auch
 einige Tage nach der Einnahme des Arzneimittels –
 Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen
 auftreten. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
 siehe Rückseite
Stand der Information: November 2017