


Gebrauchsinformation



Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dasselbe Krankheitsbild haben wie Sie.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Mygale comp. und wofür wird es angewendet?
- 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Mygale comp. beachten?
- 3. Wie ist Mygale comp. einzunehmen?
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5. Was ist sonst noch wichtig?

Mygale comp.

Mischung



Wirkstoffe: Agaricus D3, Aranea avicularis D4, Stramonium D2.

1. Was ist Mygale comp. und wofür wird es angewendet?

Mygale comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei motorischer Unruhe und Muskelkrämpfen.

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Motorische Unruhe, unwillkürliche Bewegungen, z.B. Schluckauf, Muskelkrämpfe.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Mygale comp. beachten?

Mygale comp. darf nicht angewendet werden,

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe;
- während der Schwangerschaft und in der Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei anhaltenden, wiederkehrenden oder unklaren Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Kinder

Zur Anwendung von Mygale comp. bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb nicht angewendet werden.


Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.



Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Mygale comp.

Dieses Arzneimittel enthält 118 mg Alkohol (Ethanol) pro Einzeldosis von 10 Tropfen, entsprechend 39 Vol.-% Alkohol. Die Menge in zehn Tropfen dieses Arzneimittels entspricht ca. 3 ml Bier oder ca. 1 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. Wie ist Mygale comp. einzunehmen?

Nehmen Sie Mygale comp. immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: alle 1 – 2 Stunden, höchstens 6 mal täglich, 5 – 10 Tropfen im Wechsel mit Cuprum aceticum / Zincum valerianicum Mischung einnehmen.

Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieser Zeit keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Mygale comp. vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Mygale comp. Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Anwendung von Mygale comp. kann es in seltenen Fällen zu Mundtrockenheit, Pupillenerweiterung, seelischer Erregung oder beschleunigtem Herzschlag kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung

10 g (= 10,5 ml) enthalten: Wirkstoffe: Agaricus Dil. D3 [D2 mit Ethanol 43 % (m/m), D3 mit Ethanol 30 % (m/m)] 1 g / Aranea avicularis (HAB 34) Dil. D4 [HAB, V. 4b; D3 mit Ethanol 62 % (m/m), D4 mit Ethanol 43 % (m/m)] 1 g / Stramonium Dil. D2 1 g. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 30 % (m/m).

1 ml entspricht ca. 26 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgröße

50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Mai 2022