



11 Myristica

Homöopathisches
Arzneimittel

Flüssige Verdünnung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 11,28 ml) flüssige Verdünnung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Myristica sebifera Dil. D3 10 g

Dieses Präparat enthält 69,7 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der

Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist

medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Reg.-Nr.: 2512994.00.00

Apothekenpflichtig

Nicht über 25 °C lagern

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

11 Myristica

Homöopathisches Arzneimittel

Flüssige Verdünnung, Originalpackungen zu 20 und 50

ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 11 Myristica nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 11 Myristica bei

Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 11 Myristica erst nach Rücksprache mit

dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 11 Myristica bei

Leberkranken, Epileptikern und Personen mit

organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach

Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 69,7 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bis zu 0,42 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken

oder Hirnbeschädigten sowie für Schwangere und

Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann

beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit

vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache

mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen

keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht

angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen

vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel

Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der

Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite. Nicht über 25 °C lagern.

Stand der Information: April 2016