



# 29 Natrium muriat. Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:**  
 10 g (= 10,81 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:  
 Natrium chloratum D4 Dil., Cepa D4 Dil., Argentum nitricum D4 Dil., Clematis  
 D4 Dil., Collinsonia canadensis D4 Dil., Dulcamara D4 Dil., Eupatorium  
 perfoliatum D4 Dil., Euphorbium D4 Dil., Ferrum citricum oxydatum (HAB  
 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 5a, Lösung D2 mit Wasser:Ethanol 86 % (m/m)  
 (89:10)], Gelsemium D4 Dil., Helleborus niger D4 Dil., Kalium carbonicum D3  
 Dil., Millefolium D3 Dil., Plantago major D2 Dil., Pulsatilla D4 Dil., Scilla D4 Dil.  
 je 0,625 g. Dieses Präparat enthält 54,0 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage  
 beachten!  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer  
 therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden  
 Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
 Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Apothekenpflichtig  
 Reg.-Nr.: 2513023.00.00 Nicht über 25°C aufbewahren. Inhalt: 50 ml

**Ch.-B.: 0000**      **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**29 Natrium muriat. Komplex**  
 Homöopathisches Arzneimittel  
 Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
 1 g entspricht 21 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**  
 Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
 Angabe einer therapeutischen Indikation.  
 Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**  
 Wann dürfen Sie 29 Natrium muriat. Komplex nicht  
 einnehmen? Wegen des Alkoholgehaltes soll 29 Natrium  
 muriat. Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet  
 werden. 29 Natrium muriat. Komplex enthält Achillea

millefolium (Schafgarbe). 29 Natrium muriat. Komplex  
 sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Schafgarbe  
 oder gegen andere Korbblütler nicht angewandt werden.  
 Wann dürfen Sie 29 Natrium muriat. Komplex erst nach  
 Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des  
 Alkoholgehaltes soll 29 Natrium muriat. Komplex bei  
 Leberkranken, Epileptikern und Personen mit  
 organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach  
 Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und  
 Warnhinweise:**  
 Warnhinweis:  
 Dieses Arzneimittel enthält 54,0 Vol.-% Alkohol.  
 Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung  
 werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei  
 Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken  
 oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und  
 Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann  
 beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
 Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit  
 beachten? Da keine ausreichend dokumentierten  
 Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und  
 Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach  
 Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
 Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur  
 Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine  
 ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll  
 deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet  
 werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
 Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen  
 vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel  
 Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist  
 die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Hinweis: siehe  
 Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**  
 siehe Rückseite  
**Stand der Information:** November 2017