

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss neo-angin® Halstabletten zuckerfrei jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3-4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei beachten?
3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

neo-angin®

HALSTABLETTEN

ZUCKERFREI

Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und bei Erwachsenen
Wirkstoffe in einer Lutschtablette: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,20 mg, Amylmetacresol 0,60 mg, Levomenthol 5,72 mg

1. Was sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sind ein Hals- und Rachen therapeutikum. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei beachten?

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei dürfen nicht angewendet werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol, Pfefferminzöl, Ponceau 4R oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin Halstabletten zuckerfrei sind,
- von Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren

Bei Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin® Halstabletten zuckerfrei dürfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei

Dieses Arzneimittel enthält Isomalt. Bitte nehmen Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. 1 Lutschtablette enthält 2,6 g Isomalt entsprechend ca. 0,13 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Isomalt. Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei anzuwenden?

Wenden Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren lassen alle 2-3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen (maximal 6 Tabletten pro 24 Stunden).



32 008 046 20P0111 112

Bezeichnung: PB neo-angin zuckerfrei	Größe: 100 x 210 mm	Lackaussparung:	Datum: 04.04.2011	Version Nr.: 05	Sachbearbeiter MMP:	Verwendete Schriften:
Inhalt: -	Material: -	I) -	Prüfung und Freigabe	Wien:	Nico Jende	Bliss
Artikel-Nr.: -	Druckfarbe/ Winkelung bei einer Rasterweite von 175 lpi: Black	II) -	<input type="checkbox"/> Frei	Wien:	überprüft durch: Sandra Klages	
Teile-Nr.: 32 008 046		III) -	<input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich			
Druck-Kennz.: 20P0111			Prüfung und Freigabe Berlin:			
Laetus-Code: 112			<input type="checkbox"/> Frei		Geprüft durch PPC: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
EAN-Code: -			<input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich		EAN lesbar: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
PZN-Code: -						
Land: D	Farbverteilung: VS:1c RS:1c					
						Seite: 1 von 2



Die neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3-4 Tage angewendet werden.

Wenn Sie die Einnahme von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei vergessen haben

Sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, nehmen Sie bitte nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann neo-angin® Halstabletten zuckerfrei Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten.

Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und der Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30°C lagern.

6. Weitere Informationen

Was neo-angin® Halstabletten zuckerfrei enthält:

Die Wirkstoffe sind:

1 Lutschtablette enthält:	2,4-Dichlorbenzylalkohol	1,20 mg
	Amylmetacresol	0,60 mg
	Levomenthol	5,72 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Isomalt 2 H₂O, Weinsäure (Ph.Eur.), Ponceau 4R (Zubereitung 80%).

Inhalt der Packung:

Originalpackung mit 24 (bzw. 48) Lutschtabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Straße 41

12277 Berlin

Tel. 030/72007-266

Fax 030/72007-326

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2010.

Gebrauchsinformation

neo-angin®

HALSTABLETTEN

ZUCKERFREI

32.008.046 20P0111 112

Bezeichnung: PB neo-angin zuckerfrei Inhalt: - Artikel-Nr.: - Teile-Nr.: 32 008 046 Druck-Kennz.: 20P0111 Laetus-Code: 112 EAN-Code: - PZN-Code: - Land: D	Größe: 100 x 210 mm Material: - Druckfarbe/ Winkelung bei einer Rasterweite von 175 lpi: Black 45°	Lackausparung: I) - II) - III) -	Datum: 04.04.2011 Versions Nr.: 05 Prüfung und Freigabe Wien: <input type="checkbox"/> Frei <input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich Prüfung und Freigabe Berlin: <input type="checkbox"/> Frei <input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich	Sachbearbeiter MMP: Nico Jende überprüft durch: Sandra Klages Geprüft durch PPC: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein EAN lesbar: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Verwendete Schriften: Bliss Seite: 2 von 2
Farbverteilung: VS:1c RS:1c					