

## Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bronchostad® Hustenlöser jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

### Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Bronchostad® Hustenlöser und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchostad® Hustenlöser beachten?
3. Wie ist Bronchostad® Hustenlöser einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchostad® Hustenlöser aufzubewahren?

# Bronchostad® Hustenlöser Tropfen

Wirkstoff: Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Efeublätter-Trockenextrakt

100 g (=107,8 ml) Flüssigkeit enthalten 1,98 g Trockenextrakt aus Efeublättern Ph. Fr. X in einem Verhältnis von Droge zu Extrakt wie (6,0-7,0:1). Das Auszugsmittel ist Ethanol 40% (m/m)

### Die sonstigen Bestandteile sind:

Acesulfam-Kalium, Maltodextrin, Povidon K 30, Propylenglycol, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser, Kirsch-Aroma.

Bronchostad® Hustenlöser ist in Packungen mit 20ml (N1) Flüssigkeit erhältlich.

### 1. Was ist Bronchostad® Hustenlöser und wofür wird es angewendet?

**1.1** Bronchostad® Hustenlöser ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

### **1.2** von:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel  
Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259

Internet: [www.stada.de](http://www.stada.de)

### hergestellt von:

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

### **1.3** Bronchostad® Hustenlöser wird angewendet

- zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen;
- bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchostad® Hustenlöser beachten?

#### **2.1** Bronchostad® Hustenlöser darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Dieses Arzneimittel darf bei Kindern unter einem Jahr nicht angewendet werden.

#### **2.2** Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchostad® Hustenlöser ist erforderlich

Bei länger anhaltenden Beschwerden oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

#### **a) Schwangerschaft und Stillzeit**

Dieses Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und während der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen.

#### **b) Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **2.3** Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

wurden nicht untersucht. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **2.4** Bei Einnahme von Bronchostad® Hustenlöser zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

sind keine Besonderheiten zu beachten.

### 3. Wie ist Bronchostad® Hustenlöser einzunehmen?

Nehmen Sie Bronchostad® Hustenlöser immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **3.1** Art der Anwendung

Zum Einnehmen

#### **3.2. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Kinder von 1-3 Jahren**

3-mal täglich 7 Tropfen (entsprechend 160 mg Efeublätter pro Tag)

#### für Kindern von 4-12 Jahren

3-mal täglich 10 Tropfen

(entsprechend 225 mg Efeublätter pro Tag)

## Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden Sie ihn an:

**STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel**

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Bronchostad® Hustenlöser Tropfen interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

für Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre  
3-mal täglich 12-15 Tropfen  
(entsprechend 270-340 mg Efeublätter pro Tag)

10 Tropfen enthalten 0,58 g Flüssigkeit.

Nehmen Sie die Tropfen bitte unverdünnt oder in etwas Wasser ein und trinken Sie ausreichend Flüssigkeit nach (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Bronchostad<sup>®</sup> Hustenlöser zu stark oder zu schwach ist.

#### Wie lange sollten Sie Bronchostad<sup>®</sup> Hustenlöser einnehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht länger als einige Tage ein. Siehe auch unter 2.2 „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Bronchostad<sup>®</sup> Hustenlöser ist erforderlich“.

#### 3.3 Wenn Sie eine größere Menge Bronchostad<sup>®</sup> Hustenlöser eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie von diesem Arzneimittel eine größere Menge eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

#### 3.4 Wenn Sie die Einnahme von Bronchostad<sup>®</sup> Hustenlöser vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme wie vom Arzt oder in dieser Gebrauchsinformation beschrieben fort.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben.

Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Efeublätter-Trockenextrakt, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

**Sehr häufig:**  
Mehr als 1 von 10 Behandelten

**Häufig:**  
Weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten

**Gelegentlich:**  
Weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten

**Selten:**  
Weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten

**Sehr selten:**  
Weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

#### 4.1 Nebenwirkungen

Sehr selten können nach Einnahme von Efeu-haltigen Arzneimitteln allergische Reaktionen (Atemnot, Schwellungen, Hautrötungen, Juckreiz) auftreten. Bei empfindlichen Personen können gelegentlich Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auftreten.

4.2 Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind.

#### 5. Wie ist Bronchostad<sup>®</sup> Hustenlöser aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25° C aufbewahren.

Nach Anbruch 6 Wochen haltbar.

#### Stand der Information:

1. Januar 2005

9210124  
0501

0-06226-03

STADA

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Geburtsdatum: