

**Gebrauchsinformation**


Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Ky-Cor f jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 6 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie den Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Ky-Cor f und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ky-Cor f beachten?
3. Wie ist Ky-Cor f einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ky-Cor f aufzubewahren?

# Ky-Cor f



**Wirkstoff:** Weißdornblätter mit Blüten-Trockenextrakt.

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

1 überzogene Tablette enthält 200 mg Weißdornblätter mit Blüten-Trockenextrakt (4-7:1), Auszugsmittel: Ethanol 45 % (V/V).

**Die sonstigen Bestandteile sind:**

Mikrokristalline Cellulose, Sucrose (Saccharose), Talkum, Maltodextrin, Calciumcarbonat, Crospovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Titandioxid, weißer Ton, Arabisches Gummi, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Hypromellose, Macrogol 6000, Stärkehydrolysat, Stearinsäure, Glycerol 85 %, Montanglycolwachs.

Hinweis: Pro überzogene Tablette werden ca. 0,012 BE aufgenommen.

**Darreichungsform und Inhalt**

Packung mit 100 überzogenen Tabletten (N3).

**1. Was ist Ky-Cor f und wofür wird es angewendet?**

Ky-Cor f ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Herzerkrankungen.

Pharmazeutischer Unternehmer:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstraße 1a

17498 Mesekehenagen

Tel.: 03 83 51 / 53 69 - 0

Fax: 03 83 51 / 53 69 - 25

www.cheplapharm.de

Hersteller:

Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien + Co.

Hoesselgasse 20

Werk Spittal

A-9800 Spittal / Drau

Ky-Cor f wird angewendet bei nachlassender Leistungsfähigkeit des Herzens entsprechend Stadium II nach NYHA.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ky-Cor f beachten?**

Ky-Cor f darf nicht eingenommen werden wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ky-Cor f ist erforderlich:**

Bei unverändertem Fortbestehen der Krankheitssymptome über sechs Wochen oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine Rücksprache mit dem Arzt zu empfehlen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

a) bei Kindern

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

b) in Schwangerschaft und Stillzeit

Aus der verbreiteten Anwendung von Weißdorn als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken und Nebenwirkungen in der Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen jedoch nicht vor. Das Arzneimittel sollte daher in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

c) Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

d) Wichtige Warnhinweise zu bestimmten sonstigen Bestandteilen

Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie Ky-Cor f erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln** wurden bisher nicht untersucht. Eine Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel kann daher nicht ausgeschlossen werden. Bisher sind jedoch keine Wechselwirkungen bekannt geworden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt.

**Bei Einnahme von Ky-Cor f zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken** sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **3. Wie ist Ky-Cor f einzunehmen?**

Nehmen Sie Ky-Cor f immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Art der Anwendung**

Zum Einnehmen.

#### **Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

für Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren:  
2 - 3-mal täglich 1 überzogene Tablette.

Die überzogenen Tabletten nicht im Liegen einnehmen.

Nehmen Sie die überzogene Tablette vor oder zu den Mahlzeiten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

#### *Wie lange sollten Sie Ky-Cor f einnehmen?*

Es wird empfohlen, das Arzneimittel mindestens 6 Wochen und höchstens 6 Monate einzunehmen. Danach sollte der behandelnde Arzt die weitere Anwendungsdauer festlegen. Beachten Sie auch bitte die Hinweise unter Punkt 2.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Ky-Cor f eingenommen haben, als Sie sollten:**

Wenn Sie versehentlich einmal die doppelte oder dreifache Einzeldosis (entspricht 2 - 3 überzogenen Tabletten dieses Arzneimittels) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, kann es zum verstärkten Auftreten der Nebenwirkungen kommen (siehe unter „Nebenwirkungen“). In diesem Fall sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Ky-Cor f vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme bzw. Anwendung so fort, wie es in der Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

#### **Auswirkungen, wenn die Behandlung abgebrochen wird:**

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Im Zweifelsfalle befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben.

Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Zubereitung aus Weißdornblättern mit Blüten, auch solche höherer Dosierung oder Langzeittherapie.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b> Mehr als 1 von 10 Behandelten	<b>Häufig:</b> Mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b> Mehr als 1 von 1000 Behandelten	<b>Selten:</b> Mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b> 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Selten können Magen-Darm-Beschwerden, Schwächegefühl oder Hautausschlag auftreten. Diese Beschwerden klingen in der Regel nach Absetzen des Arzneimittels innerhalb weniger Tage ab.

Bei anhaltenden Nebenwirkungen wenden Sie sich an einen Arzt, der über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheidet.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Hautausschlag) soll das Arzneimittel nicht weiter eingenommen werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

### **5. Wie ist Ky-Cor f aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis angegebenem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 30 °C lagern.

Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

#### **Stand der Information:**

August 2006

