

NeyGeront®-Vitalkapseln „A“

Hartkapseln

Homöopathisches Arzneimittel



Zusammensetzung:

1 Hartkapsel enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile (379 mg): [Extractum lyophilisatum ex embryo lysat. bovis tot. (18,5%) et placenta lysat. bovis tot. (5%) et amnion lysat. bovis fetal. (3%) et funicul. umbilical. lysat. bovis fetal. (3%) et cor lysat. bovis fetal. (10%) et pancreas lysat. bovis juv. (5%) et mucos. intestinal. tenuis lysat. bovis fetal. et mucos. intestinal. crassi lysat. bovis fetal. (1:1) (5%) et lien lysat. bovis fetal. (3%) et thym. lysat. suis juv. (10%) et gland. suprarenal. lysat. bovis juv. (5%) et gland. parathyreoid. lysat. bovis juv. (1%) et testes lysat. bovis juv. (5%) et ovar lysat. bovis tot. (3%) et hypophys. lysat. suis juv. (2%) et diencephal. lysat. bovis fetal. (1,5%) et cort. cerebri lysat. bovis fetal. (10%) et hepar lysat. bovis fetal. et juv. (1:1) (10%)] Trit. D7 Lactose als Arzneiträger (HAB, V. 6/9) 20 mg, [Heparinum (23,81%) et Tocopherolum aceticum (23,81%) et Cyanocobalaminum (23,81%) et Pyridoxinum hydrochloricum (23,81%) et Procaini hydrochloridum (4,76%)] Trit. D6 Lactose als Arzneiträger (HAB, V. 6/9) 168 mg, Liothyroninum hydrochloridum Trit. D10 Lactose als Arzneiträger (HAB, V. 6/9) 40 mg, [Lecithinum (70,92%) et Triglycerida mediocatenalia (29,08%)] Trit. D1 Lactose als Arzneiträger (HAB, V. 6/9) 141 mg, Acidum glutamicum Trit. D3 Lactose als Arzneiträger (HAB, V. 6/9) 10 mg.
Sonstiger Bestandteil: Cellulose 17 mg

Darreichungsformen und Packungsgrößen:

Originalpackung: 40 Kapseln

Kurpackung: 120 Kapseln

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller:

vitOrgan Arzneimittel GmbH, Postfach 4240, 73745 Ostfildern
Tel. (0711) 44812-0, Fax (0711) 44812-41

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Wechselwirkungen:

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierung und Anwendungsweise:

Wenn nicht anders verordnet, ist 1-2mal täglich eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten, morgens und abends, jeweils eine Kapsel mit reichlich Flüssigkeit unzerkaut einzunehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewandt werden.

Nebenwirkungen:

In Ausnahmefällen kann es bei allergisch disponierten oder vorsensibilisierten Patienten unter der vorgeschlagenen Dosierung zu Übelkeit, Pulsbeschleunigung, Beklemmungsgefühl oder Exanthem kommen. Diese sind durch Antiallergika (Antihistaminika), gegebenenfalls Glucocorticoide, beherrschbar. Bei lokalen Reizerscheinungen sind entzündungshemmende Externa anzuwenden.

Hinweis:

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise/Haltbarkeit:

Nicht über 25° C aufbewahren.

NeyGeront®-Vitalkapseln „A“ sollen nach Ablauf des auf dem Blister und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewandt werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 11649

Datum der Fassung der Packungsbeilage: 8/2007

