




Kattwigast®



Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Gentiana lutea Trit.	D 3	62,50 mg
Chamomilla recutita Trit.	D 2	62,50 mg
Juniperus communis Trit.	D 3	62,50 mg
Artemisia absinthium Trit.	D 3	62,50 mg

sonstige Bestandteile:

Kartoffelstärke, Magnesiumstearat

Darreichungsform und Inhalt:

50,100 Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel bei Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden.

Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Verdauungsorgane mit dyspeptischen Beschwerden (leichte krampfartige Magen-Darm-Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen).

Hinweis: Bei Verfärbung des Stuhl oder Blut im Stuhl sowie bei länger als 3 Tage dauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Kamille oder andere Korbblütler.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Kattwigast in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine aus-



reichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene bei akuten Zuständen 1 Tablette alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 12 mal täglich, bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich 1 Tablette ein. Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollte man die Tablette im Mund zergehen lassen. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis für den Fall der Überdosierung:

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Hinweis: Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information: Dezember 2000

 **Kattwiga Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, 48514 Nordhorn**

500377A