## Gebrauchsinformation

bene-Arzneimittel GmbH · Herterichstraße 1 · 81479 München · Tel.: 089 / 7 49 87 -0 · Fax: 089 / 7 49 87 -142

# Thrombocid® Gel

**Zusammensetzung**

100 g Thrombocid® Gel enthalten:
1,5 g Natriumpentosanpolysulfat
(entsprechend 50.000 I.E. Heparin)
30 mg Rosmarinöl
30 mg Latschenkieferöl
15 mg Melissenöl franz. 73192

**Anwendungsgebiete**

Bei oberflächlichen Venenentzündungen und deren Folgen (Schwellungen, Wadenkrämpfe, Beingeschwüre), Stauungen, Schmerzen bzw. Schweregefühl in den Beinen, Krampfadern.

Bei Sport- und Unfallverletzungen, Verstauchungen, Quetschungen, Prellungen, Verrenkungen und Blutergüssen sowie zur Nachbehandlung.

Bei entzündlichen Schwellungen sowie Sehnenscheidenentzündungen.

**Gegenanzeigen**

Bei Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe sollte Thrombocid® Gel nicht angewendet werden.

Thrombocid® Gel sollte nicht auf offene Wunden oder Schleimhäute aufgebracht werden.

**Nebenwirkungen**

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen gegen einen der Inhaltsstoffe auftreten (wie bläschenförmiger Hautausschlag und Trockenheit der Haut). In diesem Fall soll das Medikament nicht mehr angewendet werden.

Wie bei hoch- und niedermolekularen Heparinen können nach intravenöser, subkutaner oder intramuskulärer Applikation des Wirkstoffes Natriumpentosanpolysulfat dosisunabhängig sogenannte "Heparin-assoziierte Thrombozytopenien (HAT)" auftreten. Nach Anwendung von Thrombocid® Gel wurde solch eine unerwünschte Arzneimittelwirkung jedoch bisher nie beobachtet. Wir bitten dennoch um besondere Aufmerksamkeit.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Sind nicht bekannt

**Dosierung und Art der Anwendung**

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, mehrmals täglich Thrombocid® Gel dünn auf das erkrankte Gebiet und dessen Umgebung auftragen. Bei Beingeschwüren soll nur die Umgebung mit dem Gel eingestrichen werden.

**Darreichungsformen und Packungsgrößen**

Tuben zu 40 g (N1) und 100 g (N2) Gel

Anstaltspackungen mit 10 Tuben zu 100 g Gel

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

---

**Eigenschaften**

Thrombocid® Gel enthält in besonders hoher Konzentration den Wirkstoff Natriumpentosanpolysulfat, der entzündungshemmend, abschwellend und durch Abbau und Verhinderung von Gerinnseln durchblutungsfördernd wirkt.

Die ätherischen Öle in Thrombocid® Gel haben zusätzlich krampflösende und lokal schmerzlindernde Eigenschaften.

62600300/Z10-1