



**Gebrauchsinformation:  
Information für den Anwender**

## **SALICYL-VASELIN 10%**

Salbe zum Auftragen auf die Haut  
Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr und Erwachsenen

Wirkstoff: Salicylsäure

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss dieses Arzneimittel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist dieses Arzneimittel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels beachten?
3. Wie ist dieses Arzneimittel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist dieses Arzneimittel und wofür wird es angewendet?**

Salicyl-Vaseline 10% ist ein Hornhautmittel.

Diese Salbe wird äußerlich angewendet bei:

- vermehrter Hornhautbildung (Hyperkeratosen),
- Hühneraugen (Clavus),
- Schwielen (Kallus).

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels beachten?**

#### **2.1 Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Salicylsäure oder einen der sonstigen Bestandteile von Salicyl-Vaseline 10% sind,
- bei Kontaktüberempfindlichkeit,
- während der Schwangerschaft,
- bei Säuglingen,
- bei eingeschränkter Nierenfunktion.

#### **2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung dieses Arzneimittels ist erforderlich,**

wenn die unter Kapitel 1 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **2.3 Kinder**

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10% grundsätzlich nicht bei Säuglingen an.

#### **2.4 Bei Anwendung dieses Arzneimittels mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken. Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

#### **2.5 Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10% nicht während der Schwangerschaft an.

Während der Stillzeit darf Salicyl-Vaseline 10% nicht im Brustbereich angewendet werden.

Stillende dürfen Salicyl-Vaseline 10% zur Behandlung von Hühneraugen nur für Flächen bis 5 cm<sup>2</sup> verwenden.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **2.6 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

Hornhautmittel

*Bombastus*

### 3. Wie ist dieses Arzneimittel anzuwenden?

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10% immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### 3.1 Dosierung und Art der Anwendung

Alter	Maximale Tagesdosis Salbe	Maximale Tagesdosis Wirkstoff
Kinder ab 1 Jahr	höchstens 2 g	weniger als 0,2 g
Erwachsene	weniger als 20 g	weniger als 2,0 g

Tragen Sie Salicyl-Vaseline 10% ein- bis zweimal täglich auf die Haut auf.

#### 3.2 Dauer der Anwendung

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10% ohne ärztlichen Rat nicht länger als 7 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Salicyl-Vaseline 10% zu stark oder zu schwach ist.

#### 3.3 Wenn Sie eine größere Menge des Arzneimittels angewendet haben, als Sie sollten

und sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unter Nebenwirkungen aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Salicyl-Vaseline 10% Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### 4.1 Mögliche Nebenwirkungen

Auf den Stellen, an denen Salicyl-Vaseline 10% aufgetragen wurde, kann es zu Hautreizungen kommen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu einer vorher nicht bekannten Überempfindlichkeitsreaktion (Kontaktsensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

#### 4.2 Besondere Hinweise

Wenden Sie Salicyl-Vaseline 10% nicht weiter an, wenn die oben genannten Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten sollten.

#### 4.3 Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?

#### 5.1 Allgemeine Hinweise

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### 5.2 Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25 °C lagern.

Im Originalbehältnis fest verschlossen aufbewahren.

#### 5.3 Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Anbruch ist Salicyl-Vaseline 10% innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen.

### 6. Weitere Informationen

#### 6.1 Was dieses Arzneimittel enthält

100 g Salbe enthalten den Wirkstoff: 10 g Salicylsäure.

Die sonstigen Bestandteile sind: dünnflüssiges Paraffin, weißes Vaseline.

#### 6.2 Wie das Arzneimittel aussieht und Inhalt der Packung

Salicyl-Vaseline 10% ist in folgender Packungsgröße erhältlich: 100 ml Salbe in einer Tube im Umkarton.

Dieses Arzneimittel ist in einer weiteren Stärke erhältlich:

Salicyl-Vaseline 5%.

100 ml Salbe in einer Tube im Umkarton.

#### 6.3 Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Bombastus-Werke AG

Wildruffer Straße 170, 01705 Freital, Deutschland

Telefon: +49 351 65803-0, Fax: +49 351 65803-99

E-Mail: [info@bombastus-werke.de](mailto:info@bombastus-werke.de)

#### 6.4 Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt

überarbeitet im

03/2017.