



*The Barrier People*

### Wie kommt es zu unreiner, zu Akne neigender Haut ?

Unter unreiner, zu Akne neigender Haut leiden fast alle Jugendlichen in der Pubertät. Zunehmend sind aber auch Erwachsene davon betroffen. Für die Entstehung von unreiner, zu Akne neigender Haut gibt es viele Gründe. Die Talgdrüsen produzieren vermehrt Hautfett, das nicht abfließen kann, weil die Haarfollikel durch Verhornungsstörungen am Haarbalg verstopft sind. Auf diese Weise entstehen Talgpfropfen, auch Mitesser genannt, die mit Bakterien durchsetzt sein können. Wenn sich in den Mitessern Aknebakterien (*Propionibacterium acnes*) vermehren, entzündet sich das umliegende Gewebe und ein Pickel entsteht.

### Wie pflegt PAPULEX GEL ?

- PAPULEX GEL ist ein einzigartiges Gel mit 4% Nicotinamid (Vitamin B3), das Entzündungen bei zu Akne neigender Haut und Haarbalgzündungen nach der Rasur mindert.
- Durch die verschiedenen Behandlungsmaßnahmen bei unreiner, zu Akne neigender Haut ist diese oft ausgetrocknet und gereizt, wodurch es zu einem unangenehmen Spannungsgefühl kommen kann. PAPULEX GEL trägt zur Regeneration der Hornschicht (epidermale Barriere) bei.
- Die Effektivität und Verträglichkeit von PAPULEX GEL wurde durch eine kontrollierte klinische Studie an einer renommierten Institution bewiesen.
- PAPULEX GEL führt bei 2 x täglicher Anwendung über einen Zeitraum von 8 Wochen bei **86% der Anwender zu einer deutlichen Verbesserung des Hautzustandes, die Anzahl der Pickel wurde um 60 % verringert.** PAPULEX GEL enthält kein Antibiotikum.

### Wie wird PAPULEX GEL angewendet?

Vor dem Auftragen von PAPULEX GEL sollten Sie die betroffenen Hautstellen mit einem sauren Hautreinigungsmittel mit einem pH-Wert von 5,5 reinigen z.B. **PAPULEX Waschlotion !**

Tragen Sie PAPULEX GEL zweimal täglich auf die betroffenen und vorab gereinigten Hautstellen – in der Regel Gesicht, Schulter und Hals – auf und verreiben Sie es anschließend sanft und vollständig.

Tragen Sie PAPULEX GEL nach der Rasur 2x täglich auf die irritierten Hautstellen (wie Gesicht, Achseln, Bikinizone & Beine) auf, bis die Rötungen vollständig zurückgegangen sind.

Die Anwendung von PAPULEX GEL sollte mindestens über einen Zeitraum von 8 Wochen erfolgen.

## Bestandteile (INCI)

Aqua, alcohol, laureth-12, lauryl glucoside, nicotinamide, magnesium aluminium silicate, hydroxypropyl methylcellulose, citric acid.

Die Haltbarkeit von PAPULEX GEL beträgt nach dem Öffnen der Tube 12 Wochen. PAPULEX GEL sollte nicht bei Temperaturen über 25°C aufbewahrt werden.

## Das besondere Konzept von CREADERM®

CREADERM® GmbH als innovatives, pharmazeutisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Kosmetik, möchte seinen Kunden nur Produkte mit einem hohen, wissenschaftlichen Standard anbieten. Das Produktportfolio verfügt daher regelmäßig über randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudien, die in renommierten, internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Alle weiteren Informationen zu CREADERM®, dem Produktportfolio oder aktuellen Hautthemen finden Sie unter [www.creaderm.com](http://www.creaderm.com) !

Dort, wo es möglich ist, werden Naturstoffe eingesetzt. Dies trägt zur Haut- und Umweltverträglichkeit unserer Produkte bei.

PAPULEX ist auch als PAPULEX WASCHLOTION erhältlich.

**CREADERM®-Produkte erhalten Sie nur in Ihrer Apotheke.**