



43

Adonis Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,92 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:
Adonis vernalis D4 Dil., Apocynum D4 Dil., Convallaria majalis D4 Dil.,
Crataegus D1 Dil., Helleborus niger D4 Dil., Sambucus nigra D3 Dil.,
Strophanthus D4 Dil., Veratrum viride (HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr.
4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)], Arnica D4 Dil., Primula veris D3 Dil. je 1
g
Dieses Präparat enthält 57,6 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren
Reg.-Nr.: 2513028.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation 43 Adonis Komplex

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 43 Adonis Komplex nicht einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 43 Adonis Komplex bei
Alkoholkranken nicht angewendet werden.
43 Adonis Komplex enthält Primula veris und Arnica

montana.
43 Adonis Komplex sollte daher bei Überempfindlichkeit
gegen Primeln sowie gegen Arnica oder gegen andere
Korbblütler nicht angewandt werden.
Wann dürfen Sie 43 Adonis Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 43 Adonis Komplex bei
Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen
Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem
Arzt angewendet werden.
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:**
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 57,6 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bis zu 0,34 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,
Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder
Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die
Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder
verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur
Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen,
sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt
angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll

deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet
werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor
bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser
einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der
Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: Dezember 2018