



103

**Anisum
Komplex**

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:

10 g (= 11,03 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anisum (HAB 1934) D3 Dil. [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)], Drosera D2 Dil., Aconitum D4 Dil., Belladonna D4 Dil., Chamomilla D2 Dil., Lycopodium D4 Dil., Ipecacuanha D4 Dil., Veratrum album D4 Dil., Phosphorus D6 Dil., Myosotis arvensis D3 Dil. je 1 g. Dieses Präparat enthält 59,2 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512453.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation
103 Anisum Komplex**

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 103 Anisum Komplex nicht einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 103 Anisum Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.
103 Anisum Komplex enthält Chamomilla recutita. Dieses

Arzneimittel sollte daher bei Überempfindlichkeit gegen Kamille oder gegen andere Korbblütler nicht angewandt werden.

Wann dürfen Sie 103 Anisum Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 103 Anisum Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 59,2 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite

Stand der Information: April 2016