



4

Hyoscyamus Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,93 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hyoscyamus Dil. D4, Lobelia inflata Dil. D4, Anacardium Dil. D4 je 3,3333 g
Dieses Präparat enthält 58,0 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Reg.-Nr.: 2513038.00.00 Apothekenpflichtig
Inhalt: 50 ml Nicht über 25°C aufbewahren.

Ch.-B.: 000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
4 Hyoscyamus Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 4 Hyoscyamus Komplex nicht einnehmen? Wegen des Alkoholgehaltes soll 4 Hyoscyamus Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 4 Hyoscyamus Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden? Wegen des Alkoholgehaltes soll 4 Hyoscyamus Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte 4 Hyoscyamus Komplex in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 58,0 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 2,0 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,5 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich je 5-10 Tropfen sowie bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 5-10 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser vor bzw. zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen:
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite
Stand der Information: November 2017