

*
3
4
5
0
1
9
1
0
*

223

**Plumbum
Komplex**

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 10,81 ml) Mischung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Plumbum aceticum D4
Dil., Kalium phosphoricum D4 Dil., Lavandula D4 Dil.,
Natrium carbonicum D3 Dil., Oleander D3 Dil. je 2 g
Dieses Präparat enthält 54,5 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung
fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren

Reg.-Nr.: 2512431.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

223 Plumbum Komplex

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 21 Tropfen.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 223 Plumbum Komplex nicht
einnehmen? Wegen des Alkoholgehaltes soll 223
Plumbum Komplex bei Alkoholkranken nicht
angewendet werden.

223 Plumbum Komplex darf bei Säuglingen und
Kleinkindern bis zum 6. Lebensjahr nicht angewendet
werden.

Wann dürfen Sie 223 Plumbum Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 223 Plumbum Komplex
bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit
organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit
beachten? Während der Schwangerschaft und Stillzeit
ist 223 Plumbum Komplex nicht anzuwenden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:**

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 54,5 Vol.-% Alkohol.
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung
werden bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei
Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für
Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nicht
angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit
einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit
der Einnahme zu reduzieren.

Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4 Wochen
anwenden.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels:** siehe Rückseite

Stand der Information: Dezember 2018