


* 5 1 7 0 1 9 1 0 *



168

Thapsia Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 11,17 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Thapsia (HAB 1934) D4 Dil. [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m), D4 mit Ethanol 62 % (m/m)], Arnica D4 Dil., Calendula D2 Dil., Hamamelis D2 Dil., Ledum D4 Dil., Ruta D2 Dil., Hypericum D2 Dil., Salvia off. D2 Dil. je 1,25 g
Dieses Präparat enthält 65,4 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2512427.00.00

Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

168 Thapsia Komplex

Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 168 Thapsia Komplex nicht einnehmen?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arnika und andere Korbblütler soll dieses Arzneimittel nicht

angewendet werden.

Wegen des Alkoholgehaltes soll 168 Thapsia Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 168 Thapsia Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 168 Thapsia Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 65,4 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,38 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht

angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite

Stand der Information: April 2016