

\* 9 9 7 0 1 9 1 0 \*

**57**  
**Xanthoxylon**  
**Komplex**  
Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:** 10 g (= 11,06 ml) Mischung enthalten:  
Arzneilich wirksame Bestandteile: Xanthoxylon fraxineum (HAB 1934) Dil. D4 Dil. [HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)], Chamomilla Dil. D3, Cantharis Dil. D4, Hamamelis Dil. D2, Viola tricolor Dil. D3 je 2 g  
Dieses Präparat enthält 63,0 Vol.-% Alkohol.  
Packungsbeilage beachten!  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 2512376.00.00 Inhalt: 50 ml  
**Ch.-B.: 0000** **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**57 Xanthoxylon Komplex**  
Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 22 Tropfen  
**Anwendungsgebiete:**  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Hinweise: siehe Rückseite.  
**Gegenanzeigen:**  
Wann dürfen Sie 57 Xanthoxylon Komplex nicht einnehmen?  
57 Xanthoxylon Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Überempfindlichkeit

gegen Kamille und andere Korbblütler nicht angewendet werden.  
Wann dürfen Sie 57 Xanthoxylon Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
Wegen des Alkoholgehaltes soll 57 Xanthoxylon Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
Warnhinweis:  
Dieses Arzneimittel enthält 63,0 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,38 g Alkohol zugeführt.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.  
**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**  
Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich je 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:**  
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**  
siehe Rückseite  
**Stand der Information:** April 2016