



miradent
professional prophylaxis

Fluoridgel mit 1,23 % Fluorid



Minzgeschmack
Mint flavour - Arôme menthe

mirafleur[®]-gel

mirafleur®-gel

- Indikation:**
- Zur Kariesprophylaxe mit Natriumfluorid
 - Zur Remineralisierung des Zahnschmelzes
 - Indiziert bei kariösen Läsionen und Überempfindlichkeiten
 - Vermindert erhöhtes Reizempfinden der Zähne und Zahnhälle

Inhaltsstoffe: Wasser, Sorbitol, Natriumfluorid, Dinatriumhydrogenphosphat, hydriertes Rizinusöl (PEG-40), Hydroxyethylcellulose, Phosphorsäure, Aroma

Gebrauch: Gel sanft auf der Zahnoberfläche einbürsten (haselnussgroße Menge) oder mittels Mirafleur-Tray in einer für den jeweiligen Applikationslöffel entsprechenden Menge applizieren. Eine ausreichende Kontaktzeit des Gels mit den Zähnen (2 – 4 Minuten) gewährleisten. Anschließend Mund kurz ausspülen.

Kontraindikation: Bei Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist, sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen. Die Anwendung ist kontraindiziert, sofern Wunden oder Abschürfungen an der Mundschleimhaut bestehen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit dürfen die Produkte nur auf ärztliche Anweisung hin angewendet werden. Unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung des Präparates wurden bisher nicht beobachtet. Wechselwirkungen mit anderen Präparaten sind möglich, eine individuelle Risikoabschätzung durch einen Arzt ist notwendig. Bei zu häufiger Anwendung oder zu langer Kontaktzeit oder bei zusätzlicher Fluorideinnahme besteht die Gefahr einer (Zahn-)Fluorose. Bei bekannter Überempfindlichkeit oder Allergien gegen einen der Bestandteile darf das Produkt nicht angewendet werden.

Warnung: Das Produkt ist für die Anwendung durch zahnärztliches Fachpersonal vorgesehen. Ein Verschlucken des Gels ist zu vermeiden. Nicht öfter als 1x wöchentlich anwenden. Im Falle einer Überdosierung oder eines Verschluckens des Gels in größeren Mengen sollte ein Arzt konsultiert werden. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

Das Präparat ist zur Anwendung am Menschen bestimmt. Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden. Für Kinder ab 6 Jahren das niedriger dosierte mirafleur-k-gel verwenden. Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren kann das mirafleur-gel mit 1,23% Fluorid verwendet werden. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Lagertemperaturen von 0 – 28 °C einhalten. Das Produkt und sein Inhalt sollte bei größeren Mengen gemäß den behördlichen, nationalen und regionalen Vorschriften entsorgt werden. Nach dem erstmaligen Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

LOT

REF 605 800 Medizinprodukt



D-2019041702 Rev1 (2021-03)



**HÄGER
WERKEN**



Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstraße 1

47269 Duisburg, Germany

www.hagerwerken.de

www.miradent.de



EAC



28°C

0°C

CE 250 ml e