

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

RADICON M

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Ampulle entspricht 2 g flüssige Verdünnung zur Injektion und enthält die Wirkstoffe:

Aurum chloratum Dil. D1	0,02 mg	Tuja occidentalis Dil. D1	0,10 mg
Apis mellifica Dil. D1	0,20 mg	Conium maculatum Dil. D2	0,02 mg
Hydrastis canadensis Dil. D1	0,20 mg	Sulfur Dil. D4	0,10 mg
Calcium iodatum Dil. D1	0,10 mg	Teucrium scorodonia Dil. D7	0,20 mg
Echinacea Dil. D1	0,10 mg	Acidum silicicum Dil. D9	0,10 mg
Spongilla lacustris Dil. D1	0,10 mg	Crotalus horridus Dil. D9	0,10 mg

Sonstige Bestandteile: NaOH, Isotonische Kochsalzlösung 0,9 %

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion

5 Amp. und 50 Amp. zu 2 ml zur **s.c.** oder **i.m.** Injektion

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

HANOSAN GmbH, Hanosanstraße 1, D-30826 Garbsen
Telefon 05131 / 45930, Fax 05131 / 459345

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen Bienengift. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne medizinischen Rat anwenden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf RADICON M nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie:

- Tuberkulose,
- Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen (Leukosen),
- entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen),
- Autoimmunerkrankungen,
- multipler Sklerose,
- AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen,
- Diabetes mellitus

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels als Injektion bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Den Inhalt angebrochener Ampullen nicht für spätere Injektionen weiterverwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Beeinflussung der Wirkung von anderen Arzneimitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, jeden 3. Tag 1 bis 2 ml subcutan oder intramuskulär langsam injizieren.

Dauer der Anwendung:

Wegen des Bestandteils Echinacea sollte RADICON M ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen angewendet werden.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus „Echinacea“ (Sonnenhut) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und den Arzt aufsuchen.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25° C lagern!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: Mai 2017



Hilft mit den Kräften der Natur

RADICON M