

Gebrauchsinformation - bitte aufmerksam lesen

Rytesthin-Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen *Rytesthin-Tropfen* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind *Rytesthin-Tropfen* und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Rytesthin-Tropfen* beachten?
3. Wie sind *Rytesthin-Tropfen* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind *Rytesthin-Tropfen* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind *Rytesthin-Tropfen* und wofür werden sie angewendet?

Rytesthin-Tropfen ist ein homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Rytesthin-Tropfen* beachten?

Rytesthin-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Zimt oder Perubalsam oder einen der arzneilich wirksamen oder einen der sonstigen Bestandteile von *Rytesthin-Tropfen* sind.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern bis 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Einnahme von *Rytesthin-Tropfen* mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Rytesthin-Tropfen*:

Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel bei Alkoholkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Dies gilt auch, wenn Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt leberkrank waren.

Dieses Arzneimittel enthält 47 Vol.-% Alkohol.

3. Wie sind *Rytesthin-Tropfen* einzunehmen?

Nehmen Sie *Rytesthin-Tropfen* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt *Rytesthin-Tropfen* nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da *Rytesthin-Tropfen* sonst nicht richtig wirken können!

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen schräg in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

Wie lange sollten Sie *Rytesthin-Tropfen* einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

BD 11086 V02

Wenn Sie eine größere Menge Rytesthin-Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Einnahme von sehr großen Mengen ist jedoch der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts einer 100 ml Packung werden bis zu 40 g Alkohol aufgenommen. Dies kann, insbesondere bei Kindern, zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können *Rytesthin-Tropfen* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Aufgrund des Bestandteils Cinnamomum können allergische Haut- und Schleimhautreaktionen auftreten.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung bei Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Rytesthin-Tropfen aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Falt-schachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittellent-sorgung.

6. Weitere Informationen

Was Rytesthin-Tropfen enthalten:

10 g (entsprechend 10,7 ml) enthalten an Wirkstoffen:

Asa foetida D4 dil.	0,5 g
Myristica fragrans D4 dil.	0,5 g
Valeriana officinalis D3 dil.	0,5 g
Cinnamomum D4 dil.	1,0 g
Lupulinum D4 dil.	0,5 g
Semecarpus anacardium D6 dil.	0,5 g
Strychnos ignatii D6 dil.	0,5 g
Kalium bromatum D6 dil.	0,5 g

Die Bestandteile Asa foetida D4 dil., Myristica fragrans D4 dil., Cinnamomum D4 dil. und Lupulinum D4 dil. sowie die Bestandteile Semecarpus anacardium D6 dil., Strychnos ignatii D6 dil. und Kalium bromatum D6 dil. werden jeweils über 2 Stufen gemeinsam potenziert.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, gereinigtes Wasser

Wie Rytesthin-Tropfen aussehen und Inhalt der Packung:

Tropfflasche aus Braunglas mit klarer, farbloser Flüssigkeit und schwach knoblauchartigem Geruch

Tropfflasche mit 30 ml (N1), 100 ml (N2) Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

pharmarissano

Arzneimittel GmbH
Haldenweg 5a
67278 Bockenheim
Tel.: 06359 - 949 240
Fax: 06359 - 949 241

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juni 2020 überarbeitet.

V02