

## Gebrauchsinformation, bitte sorgfältig lesen!

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Kollateral forte

Dragees

Wirkstoff: Moxaverinhydrochlorid

### Zusammensetzung:

1 Dragee enthält

#### - arzneilich wirksamer Bestandteil

Moxaverinhydrochlorid 150 mg

#### - sonstige Bestandteile

Maisstärke; Povidon; Talkum; Magnesiumstearat; Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat; mikrokristalline Cellulose; Lactose; Eudragit E 12,5; Magnesiumoxid; Saccharose; Kaliummonohydrogenphosphat; Macrogol 35.000; Glucosesirup; Calciumcarbonat; Titandioxid; Farbstoff E 104-110; Carnaubawachs; gebleichtes Wachs

### Darreichungsform und Inhalt:

50 Dragees (N2)

100 Dragees (N3)

### Wirkungsweise:

Förderung der Durchblutung (Weitstellung der Blutgefäße und Verbesserung der Fließfähigkeit des Blutes)

**URSAPHARM, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken, Tel.: 06805/9292-0 Fax: 06805/929288**

### Anwendungsgebiete:

Durchblutungsstörungen der Bein- und Armgefäße: Kribbeln, Taubheitsgefühl, Kältegefühl, nächtliche Ruheschmerzen, krampfartige Schmerzen in der Wadenmuskulatur beim Gehen, Blässe, Blaufärbung bzw. Absterben von Gewebe, Unterschenkelgeschwür.

Durchblutungsstörungen der Hirngefäße: Vergeßlichkeit, Konzentrationsmangel, Gedächtnisschwäche, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Arteriosklerotisch bedingte Affektlabilität und Orientierungsstörungen. Akutbehandlung von Seh- und Hörstörungen.

Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße: Angina pectoris, Herzinfarktbehandlung. Durchblutungsstörungen bei Zuckerkrankheit und Nikotinmißbrauch.

### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Kollateral forte nicht einnehmen?*

Kollateral forte soll nicht angewendet werden bei akuten Magenblutungen sowie zerebralen Massenblutungen bei Schlaganfall.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Erfahrungen über die Anwendung von Kollateral forte in Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor.

**URSAPHARM**  
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Keine

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kollateral forte nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Kollateral forte sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Kollateral forte einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene zu Beginn der Behandlung sowie in akuten Fällen 3 mal täglich 2 Dragees ein. Danach kann auf eine Normaldosis von 2-3 mal täglich 1 Dragee reduziert werden.

Wie und wann sollten Sie Kollateral forte einnehmen?

Bitte nehmen Sie die Dragees unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. ein Glas Wasser) nach den Mahlzeiten ein.

Wie lange sollten Sie Kollateral forte einnehmen?

Entsprechend dem Krankheitsverlauf wird Kollateral forte über mehrere Wochen bis Monate angewendet. Eine Daueranwendung ist möglich.

**Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Was ist zu tun, wenn Kollateral forte in zu großen Mengen angewendet wurde?

Aufgrund der angesprochenen guten Verträglichkeit von Kollateral forte sind bedrohliche Vergiftungen bisher nicht beobachtet worden und auch nicht zu erwarten. Bei massiver Überdosierung ist eine ärztliche Beratung zu empfehlen.

**Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Kollateral forte auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Seitenlasche aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nach diesem Datum nicht mehr!

**Stand der Information:**

Mai 2001

**Angabe gemäß § 109, Abs. 1, Arzneimittelgesetz:**

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

**Allgemeine Hinweise für den Patienten:**

Durchblutungsstörungen entstehen in der Regel im Laufe längerer Zeit. Die medikamentöse Behandlung zielt darauf ab, die Durchblutung der vorher schlecht versorgten Gewebe zu steigern und den Sauerstoffmangel und seine Folgen zu beheben. Kollateral forte Dragees enthalten das durchblutungsfördernde Moxaverin, das die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen verbessert und außerdem die Gefahr vermindert, daß die Blutkörperchen miteinander verkleben. Hierdurch wird die Fließfähigkeit des Blutes erhöht, das dadurch die feinsten Blutgefäße wieder besser durchströmen kann. Darüberhinaus zählt Moxaverin zur Gruppe der sog. Vasodilatoren; darunter versteht man Präparate, die über eine Weitstellung der Blutgefäße eine Verbesserung der Durchblutung bewirken: Der Therapieerfolg hängt von der genauen Einhaltung der Vorschriften Ihres Arztes und der regelmäßigen Einnahme des Arzneimittels ab. Sie sollten nicht selbstständig die Dosis reduzieren oder die Einnahme des Arzneimittels vorzeitig abbrechen. Kollateral forte Dragees sind gut verträglich und nach den Mahlzeiten einzunehmen.

**Weitere Darreichungsform:**

Kollateral i Infusionslösungskonzentrat (1 Ampulle zu 5 ml enthält 150 mg Moxaverinhydrochlorid)

TMH