



Cefasept® N, Mischung

Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen

Wirkstoffe: Echinacea Ø, Kalium phosphoricum dil. D4,
Lachesis mutus dil. D6, Hydrargyrum bichloratum dil. D8

Apothekenpflichtig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Cefasept® N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cefasept® N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefasept® N beachten?
3. Wie ist Cefasept® N einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefasept® N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST CEFASEPT® N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Cefasept® N ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der oberen Atemwege.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CEFASEPT® N BEACHTEN?

Cefasept® N darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Wirkstoffe, der sonstigen Bestandteile oder gegen Korbblütler sind.
- von Säuglingen und Kleinkindern.

Aus grundsätzlichen Überlegungen darf Cefasept® N nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen (Leukosen), entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefasept® N ist erforderlich:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung aller Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker.

Bei Einnahme von Cefasept® N mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cefasept® N in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cefasept® N

Cefasept® N enthält 33 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST CEFASEPT® N EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Cefasept® N immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als 2/3 der Erwachsenenendosis.

Art der Anwendung

Cefasept® N soll unverdünnt eingenommen werden, wobei die Flüssigkeit möglichst lange im Mund behalten werden sollte, um eine optimale Aufnahme durch die Mundschleimhaut zu gewährleisten.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Cefasept® N sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Cefasept® N eingenommen haben, als Sie sollten

Da bisher keine Intoxikationen nach Einnahme von Cefasept® N beobachtet wurden, sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Cefasept® N vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in der Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Wenn Sie die Einnahme von Cefasept® N abbrechen

Das Absetzen von Cefasept® N ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Cefasept® N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Nach Anwendung von Cefasept® N kann Speichelfluss auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen.

Wegen des Bestandteils Echinacea (Sonnenhut) können in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel

und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST CEFASEPT® N AUFZUBEWAHREN?

Aufbewahrungsbedingungen:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung nach "verwendbar bis:" angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Die Dauer der Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 3 Monate.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Cefasept® N (Mischung) enthält:

Die Wirkstoffe sind: 10 g (= 10,2 ml) enthalten:

Echinacea Ø	0,5 g
Kalium phosphoricum dil. D4	1 g
Lachesis mutus dil. D6	1 g
Hydrargyrum bicyanatum dil. D8	1 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser
(1 ml entspricht 37 Tropfen)

Wie Cefasept® N aussieht und Inhalt der Packung:

Eigenschaften: Klare, schwach gelb-grüne Flüssigkeit mit typischem Echinacea-Geruch und -Geschmack.

Inhalt: Originalpackungen mit 50 ml bzw. 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten
Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50
e-mail: cefak@cefak.com

Gebrauchsinformation zuletzt überarbeitet genehmigt: 08/2008

TAA

Cefasept® N

Mit Cefasept® N steht Ihnen eine einzigartige homöopathische Wirkstoffkombination zur Verfügung, die die körpereigene Abwehr stärkt und besonders die Infektbekämpfung im Bereich der oberen Luftwege unterstützt, mit der Folge nachlassender Beschwerden, einer verkürzten Erkrankungsdauer, sowie einer geringeren Rückfallrate.

Cefasept® N hilft, immer wiederkehrende Infekte natürlich und schonend zu überwinden, bietet dem Immunsystem eine aktive Hilfestellung im Akutfall und steigert nachhaltig die Abwehrkraft des Körpers.



Sie haben noch Fragen oder möchten Informationsmaterial - wir informieren Sie gerne!

Cefak KG - Verbraucherservice

Postfach 1360 · 87403 Kempten · Telefon: 08 31 / 5 74 01 - 0 · Fax: 08 31 / 5 74 01 - 50
e-mail: cefak@cefak.com · Internet: www.cefak.com