

# HANOTOXIN M

Stärkt das Immunsystem und hilft schnell bei gripptalen Infekten



## Allgemeine Infos

HANOTOXIN M ist angezeigt bei allen Infektionen, die mit Fieber und Schwäche verbunden sind.

Bei bestehenden und besonders bei beginnenden Infektionen verhindert HANOTOXIN M durch Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte ein Ausbreiten und führt zur schnellen Heilung.

HANOTOXIN M-Zubereitungen bieten die therapeutische Basis bei allen entzündlichen, infektiösen und chronisch toxischen Krankheiten.

## Indikation

Grippale Infekte

## Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Nicht bei Diabetes mellitus. Aus grundsätzlichen Erwägungen nicht anzuwenden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen, Kollagenosen, multipler Sklerose, AIDS-

Erkrankung, HIV-Infektion und anderen Autoimmun-Erkrankungen. Chininüberempfindlichkeit. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht, während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. Bei anhaltendem Fieber über 39° C, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## Nebenwirkungen

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Bei Anwendung eines Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht hier aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten.

## Dosierungsanleitung

Soweit nicht anders verordnet, 1mal täglich 1 bis 2 ml langsam subcutan, intramuskulär oder intravenös injizieren.

## Dauer der Anwendung

HANOTOXIN M Ampullen sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen angewendet werden.

## Inhaltsstoffe

2 g (1 Ampulle) flüssige Verdünnung zur Injektion enthalten:

Wirksame Bestandteile	Potenz	Menge	Arzneimittelbilder(Auszug)
Aconitum napellus	Dil. D 1	0,02 mg	Hochakute entzündliche Erkrankungen; schmerzhaftes Nervenerkrankungen; hochakute Herzsensationen mit Angstzuständen
Apis mellifica	Dil. D 4	0,04 mg	Entzündungen und Erkrankungen mit Flüssigkeitsansammlungen in Geweben und Körperhöhlen; Allergien; Durchfallerkrankungen; Erkrankungen der Harnorgane; Regelstörungen; entzündliche Hauterkrankungen
China	∅	4,0 mg	Fieberanfälle, allgemeine Blutvergiftung; Entzündungen der Atemwege; akute Durchfälle; Verdauungsschwäche; Gallenkoliken; Schleimhautblutungen; Blutarmut; allgemeine Entkräftung; Hautausschlag; Nervenschmerzen
Echinacea	∅	1,8 mg	Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen



Hilft mit den Kräften der Natur

HANOSAN GmbH  
Hanosanstraße 1 · 30826 Garbsen  
Tel.: 05131/4593-0 · Fax: 05131/4593-45  
info@hanosan.de · www.hanosan.de

<i>Wirksame Bestandteile</i>	<i>Potenz</i>	<i>Menge</i>	<i>Arzneimittelbilder(Auszug)</i>
Gelsemium sempervirens	Dil. D 1	0,04 mg	Kopfschmerzen; nervöse Störungen; Infektionskrankheiten; Lähmungen und Krampfleiden
Lachesis mutus	Dil. D 8	0,02 mg	Entzündungen und Blutungen der Haut und der Schleimhäute; Wechseljahresbeschwerden; Drüsenerkrankungen; Infektionskrankheiten und allgemeine Blutvergiftung; Venenentzündungen; Angina pectoris; Herz- und Kreislaufschwäche; Nervenschmerzen; Rheumatismus; Krämpfe, Lähmungen; Verhaltensstörungen und Verstimmungszustände

#### **Handelsformen**

<i>Darreichungsform</i>	<i>Packungsgröße</i>
Tabletten	OP 100 Tabletten
Mischung	OP 50 ml
Injektionslösung zur. sc., im. o. iv. Injektion	OP 5 und 50 Amp. zu 2 ml

#### **PZN**

5 St. 2647504, 50 St. 2647510

