

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

opino[®] N gel 2 %

Wirkstoff: Aescin


Zusammensetzung

100 g Gel enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Aescin 2,0 g

Sonstige Bestandteile:

Gereinigtes Wasser, Propan-2-ol, Polyethylenglycol-6-monoalkyl (C₈ - C₁₂) ether, Trometamol, Carbomer 980, Lavendelöl, Pomeranzenblütenöl, Natriumedetat (Ph. Eur.)



Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 100 g Gel (N2)

Bündelpackung mit 200 g (2 x 100 g) Gel (N3)

Abschwellendes, entzündungshemmendes Aescin-Gel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

biomo pharma GmbH, Josef-Dietzgen-Straße 3, 53773 Hennef

Tel.: 0 22 42-8 74 00

Fax: 0 22 42-8 74 04 99

Anwendungsgebiete

Zur Besserung der Beschwerden nach akuten stumpfen Verletzungen (Prellungen und Blutergüssen).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie opino N gel 2 % nicht anwenden?

opino N gel 2 % soll nicht auf offene Hautstellen, Schleimhäute und strahlenbehandelte Hautpartien aufgetragen werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Im angegebenen Dosisbereich sind keine Hinweise auf Missbildungen und schädigende Wirkungen auf den Embryo bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt opino N gel 2 % nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da opino N gel 2 % sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von opino N gel 2 % und wie oft sollten Sie opino gel 2 % anwenden?

Ein- bis zweimal täglich auf die Haut über dem erkrankten Bereich auftragen und verteilen. Einmassieren ist nicht erforderlich, wenn erwünscht, jedoch möglich.

Wie lange sollten Sie opino N gel 2 % anwenden?

opino N gel 2 % sollte ununterbrochen nicht länger als zwei Wochen angewendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von opino N gel 2 % auftreten?

In Einzelfällen können am Auftragungsort Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautrötungen und -schuppungen sowie Hauttrockenheit auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels


Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information

Januar 2005

pal-b1521-01/05-02



Patienteninformation für opino N gel 2 %

Der aus der Roßkastanie rein isolierte Wirkstoff Aescin ist als arzneilich wirksamer Bestandteil hauptsächlich in Venenpräparaten enthalten. Seine besondere Wirkung liegt darin, dass er die Gefäßwände der Venen insbesondere im Bereich der Beine (Niederdrucksystem) abdichtet und Ödeme im Gewebe verhindert. Gleichzeitig bewirkt dies ein Abschwellen von Prellungen und Blutergüssen. Darüber hinaus wirkt Aescin entzündungshemmend. Aescin bewirkt eine rasche Schmerzlinderung und beseitigt schmerzhaftige Spannungsgefühle.

opino N gel 2 % ist ein Lokalthapeutikum, das neben seinem breiten Anwendungsbereich folgende Vorzüge hat:

- schnelles Eindringen in die Haut
- hinterlässt keine Rückstände auf der Haut
- sehr gut unter Verbänden und Gummistrümpfen anwendbar, da ausgesprochen hautschonend
- angenehm kühlender Effekt
- verursacht keine Flecken
- fettet und schmiert nicht - kann daher auf unbedeckten Körperstellen aufgetragen werden
- sehr gute Verträglichkeit
- keine Gefahr für moderne Textilien

Besonders bei Beinleiden empfiehlt sich die zusätzliche orale Gabe von Aescin.