GEBRAUCHSINFORMATION

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage / Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Tannosynt® Lotio** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist **Tannosynt® Lotio** und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Tannosynt® Lotio** beachten?
3. Wie ist **Tannosynt® Lotio** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Tannosynt® Lotio** aufzubewahren?

Tannosynt® Lotio

Wirkstoff: Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff)

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff)

100 g Tannosynt Lotio enthalten:

1 g Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser; Glycerol 85 %; Zinkoxid; Talkum; Tris[alkyl{C<16>-C<18>}poly(oxyethylen)-4]phosphat; entölte Phospholipide aus Sojabohnen; hochdisperses Siliciumdioxid; 2-Propanol (Ph. Eur); Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur); Carrageenan, Natriumsalz

Tannosynt Lotio, Suspension zur Anwendung auf der Haut, ist in Flaschen mit 100 g (N1) erhältlich.

1. Was ist Tannosynt Lotio und wofür wird sie angewendet?

1.1 **Tannosynt Lotio** ist ein Gerbstoffpräparat mit entzündungshemmender und juckreizlindernder Wirkung.

1.2 Hergestellt von: Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, 21465 Reinbek
Telefon: (040) 727 04 0
Telefax: (040) 7229296
info@almirall.de
www.almirall.de

1.3 **Anwendungsgebiete: Tannosynt Lotio** wird angewendet zur Behandlung akut entzündlicher, nässender und juckender oberflächlicher Hauterkrankungen, insbesondere in Hautfalten (Achselhöhlen, Genito-Anal-Bereich, unter der Brust, zwischen den Oberschenkeln, den Fingern und Zehen).
Dazu gehören zum Beispiel: Hautentzündungen im Windelbereich (Windeldermatitis) beim Säugling und Kleinkind, die Lokalbehandlung juckender Hautausschläge, wie z.B. Windpocken oder die vermehrte Schweißabsonderung (Hyperhidrosis).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Tannosynt Lotio beachten?

2.1 **Tannosynt Lotio** darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen synthetischen Gerbstoff, Parahydroxybenzoate und deren Ester (Parabene; E 214 - E 219) oder einen der sonstigen Bestandteile.

Tannosynt Lotio darf nicht am Auge angewendet werden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von **Tannosynt Lotio** ist erforderlich.

a) Wegen der augenreizenden Wirkung des synthetischen Gerbstoffs ist bei der Anwendung von **Tannosynt Lotio** ein Augenkontakt durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu vermeiden.
Bei Augenkontakt mit Tannosynt Lotio sollten die Augen sofort für die Dauer von ca. 10 Minuten unter fließendem Wasser gespült und anschließend ein Augenarzt konsultiert werden.

b) Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

c) Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von **Tannosynt Lotio**:
Methyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Tannosynt Lotio kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Bisher keine bekannt.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist Tannosynt Lotio anzuwenden?

Wenden Sie **Tannosynt Lotio** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 **Tannosynt Lotio** ist nur zur äußerlichen Anwendung auf der Haut bestimmt.

3.2 Vor Gebrauch gut schütteln!

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollten Sie **Tannosynt Lotio** nach kräftigem Schütteln der Flasche ein- bis zweimal täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen.
Bei Bedarf ist eine häufigere Anwendung möglich.

Die Anwendung von Tannosynt Lotio sollte so lange fortgeführt werden, bis die entzündlichen Hauterscheinungen, wie Juckreiz, Brennen und Rötung abgeklungen sind. In der Regel ist eine Anwendungsdauer von 1-2 Wochen ausreichend. Sollten sich nach einer 14-tägigen regelmäßigen Anwendung von **Tannosynt Lotio** die Beschwerden nicht gebessert haben oder sollten nach Abschluss der Behandlung erneut Beschwerden auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Bei der Behandlung der vermehrten Schweißabsonderung kann **Tannosynt Lotio** über einige Wochen auch ohne ärztliche Konsultation angewendet werden.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Tannosynt Lotio** zu stark oder zu schwach ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Tannosynt Lotio** Nebenwirkungen haben.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

4.1 Gelegentlich (0,1-1%) kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (Kontaktdermatitis) und leichten Hautreaktionen wie Brennen, Rötung und Juckreiz kommen.

Überempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Wirkstoff von **Tannosynt Lotio** wurden bisher nur in Einzelfällen beschrieben.

Methyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

4.2 Sollte eine der genannten möglichen Nebenwirkungen auftreten, ist die Behandlung zu unterbrechen und ein Arzt aufzusuchen.

4.3 Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

5. Wie ist Tannosynt Lotio aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden!

Nach Anbruch des Behältnisses ist **Tannosynt Lotio** 6 Monate haltbar.

Stand der Information: März 2008

HINWEISE FÜR PATIENTEN!

Liebe Patientin,
lieber Patient,

zur Behandlung Ihrer Hauterkrankung haben Sie **Tannosynt Lotio** erhalten. Wir möchten Ihnen hierzu einige ergänzende Informationen geben.

Die Herkunft des Gerbstoffes
Tannosynt Lotio enthält einen synthetischen Gerbstoff. Schon unsere Vorfahren kannten die günstige Wirkung von Gerbstoffen auf die Haut: Das Bad mit der Eichenrinde, den Umschlag mit Heidelbeeren und schwarzem Tee. In einer ganzen Reihe von Rinden und Blättern kommen Gerbstoffe unterschiedlicher Zusammensetzung vor. Tannosynt Lotio enthält einen synthetischen Gerbstoff, der haltbar ist und nicht färbt.

Wie wirkt Gerbstoff?
Überall dort, wo die Hautoberfläche verletzt ist, heftet sich der Gerbstoff an und entfaltet verschiedene Wirkungen. Im Gewebswasser der Hautspalten (dessen Austreten die Grundlage des Nässens ist) lässt er die Eiweißstoffe gerinnen (darin besteht das Wesen des Gerbens), die dadurch einen festen Film über der offenen Stelle bilden und weiteren Flüssigkeitsverlust, weiteres Nässen, verhindern. In diesem Film werden mit dem Eiweiß auch entzündungs- und juckreizverursachende Substanzen gebunden, Bakterien und Pilze eingeschlossen und inaktiviert.

Der Erfolg: Brennen und Juckreiz verschwinden, die Entzündung klingt ab, und das Nässen geht zurück.

Tannosynt Lotio ist geeignet zur Behandlung von Windpocken. Der quälende Juckreiz wird rasch gelindert. Die Zinksuspensionsgrundlage zur Anwendung auf der Haut unterstützt die Austrocknung der Pusteln, es kommt zur narbenlosen Abheilung.

Was ist über die Verträglichkeit von Gerbstoff zu sagen?
Gerbstoff wird in den Hautschichten der erkrankten Regionen fest gebunden. Er dringt nicht tiefer in die Unterhaut ein, wird nicht in die Blutbahn aufgenommen und auch nicht im Körper verteilt. Gerbstoff ist an Ort und Stelle sehr gut verträglich.

Almirall Hermal wünscht Ihnen gute Besserung.

41022959 / D / 0308