

Gebrauchsinformation



Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Harntee 400 TAD® N

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile

100 g Granulat enthalten:

Birkenblätter-Trockenextrakt (4,3–7,7:1) 4,320 g
Auszugsmittel: Wasser

Orthosiphonblätter-Trockenextrakt (4,5–7,1:1) 2,601 g
Auszugsmittel: Wasser

Goldrutenkraut-Trockenextrakt (5,0–7,1:1) 2,133 g
Auszugsmittel: Wasser

Sonstige Bestandteile

Glucose-Monohydrat, Sucrose (Saccharose), Lactose, Glucose-Sirup, Maltodextrin, Hochdisperses Siliciumdioxid, Bitteres Fenchelöl, Anisöl, Wacholderbeeröl, Pfefferminzöl, Citronenöl

Darreichungsform und Packungsgrößen

Granulat

150 ml- und 300 ml-Glas

Stoff- und Indikationsgruppe/Wirkungsweise

Pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülung der Harnwege.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 5
D-27472 Cuxhaven

Tel.: (047 21) 606-0
Fax: (047 21) 606-333
email: info@tad.de
Internet: www.tad.de

3004113Z

Anwendungsgebiete

Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege und als Vorbeugung bei Nierengrieß.

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage muss ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Harntee 400 TAD N nicht einnehmen?

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Birkenpollen, Birkenblätter, Goldrutenkraut, Orthosiphonblätter oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

Keine Durchspülungsbehandlung bei Wasseransammlung im Gewebe (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit.

Harntee 400 TAD N darf nicht eingenommen werden, wenn Sie an einer seltenen erbten Fructose-Unverträglichkeit, einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharase-Isomaltase-Mangel leiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?


1 Messlöffel enthält 1,46 g Glucose und 1,27 g Sucrose (Zucker) entsprechend ca. 0,2 Proteineinheiten (BE). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung von Harntee 400 TAD N bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Harntee 400 TAD N soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.



Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Harntee 400 TAD N oder werden durch dieses Arzneimittel beeinflusst?

Keine bekannt

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Zum Trinken nach Bereiten eines Teeaufgusses.

Wie viel von Harntee 400 TAD N und wie oft sollten Sie dieses Arzneimittel anwenden?

1 Messlöffel mit 3,2 g Granulat wird mit ca. 150 ml kaltem oder heißem Wasser übergossen. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren trinken 5 mal täglich diese Menge Teeaufguss.

Auf reichliche Flüssigkeitszufuhr während der Behandlungsdauer ist zu achten.

Anwendungsdauer und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Harntee 400 TAD N in zu großen Mengen angewendet wurde?

Vergiftungen mit Harntee 400 TAD N sind bisher nicht bekannt geworden. Möglicherweise können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden jedoch verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Harntee 400 TAD N angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Falls Sie zu wenig von Harntee 400 TAD N genommen haben oder die Anwendung vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verschrieben oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Harntee 400 TAD N auftreten?

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Behandelten) können Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) oder allergische Reaktionen (Hautausschlag, Schwellung, Juckreiz) auftreten.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (Allergie) darf Harntee 400 TAD N nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage beschrieben sind.

Hinweis zur Haltbarkeit

Nach Ablauf des Verfalldatums soll das Arzneimittel nicht mehr angewendet werden.

Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 6 Monate haltbar.

Hinweis zur Aufbewahrung

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Im Originalbehältnis nicht über 25 °C aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Stand der Information

April 2004

Der beiliegende Messlöffel ist nur zur Verwendung für Harntee 400 TAD N bestimmt.

Nach Aufbrauchen der Dose kann der Löffel über den Hausmüll entsorgt werden.

Hersteller des Messlöffels: G. Junghans Kunststoffwaren-Fabrik, Einsteinstraße 6, D-37235 Hessisch-Lichtenau