

**Liebe Patientin, lieber Patient!**

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Gebrauchsinformation, sorgfältig lesen!****Verrucid®**

Wirkstoff: Salicylsäure

**Zusammensetzung**

1 g Lösung enthält:  
Arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,1 g Salicylsäure.  
Sonstige Bestandteile: Essigsäure, Docusat-Natrium, Rizinusöl, Pyroxylin, Ethanol, Aceton, Isobutylacetat.

**Darreichungsform und Inhalt**

Eine Packung enthält eine Flasche mit 10 ml Lösung (N1)

**Schälmittel bei Verhornungsstörungen**

GALENpharma GmbH, Postfach 3764, 24036 Kiel  
Telefon: (0431) 58 518-0, Telefax: (0431) 58 518-20

Hersteller: Paul W. Beyvers GmbH  
Schaffhausenerstraße 28-32, 12099 Berlin (Tempelhof)  
Telefon: (030) 628930-0, Telefax: (030) 628930-30

**Anwendungsgebiete**

Äußerlich als Schälmittel bei Verhornungsstörungen durch Warzen sowie bei Hühneraugen und Hornschwielen.

**Gegenanzeigen****Wann dürfen Sie Verrucid nicht anwenden?**

Verrucid darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate oder andere Bestandteile des Arzneimittels. Es ist nicht geeignet zur Anwendung am Auge und auf Schleimhäuten.

**Wann dürfen Sie Verrucid erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?**

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Verrucid nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen. Bei Anwendungen von Verrucid in der Nähe von Entzündungen und Wunden.

**Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Verrucid sollte in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, ausgenommen an einer Fläche kleiner als 5 cm<sup>2</sup>. Es sollte ferner nicht an der Brust von stillenden Müttern angewendet werden.

**Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?**

Bei Säuglingen und bei Patienten mit Niereninsuffizienz sollte eine Anwendung unterbleiben.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise****Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Bei Einhaltung der Dosierungsanleitung und Beachtung der in dieser Gebrauchsinformation gegebenen Hinweise müssen keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln****Wie beeinflusst Verrucid die Wirkung von anderen Arzneimitteln?**

Salicylsäure kann das Eindringen anderer lokal aufgetragener Arzneimittel in die Haut verstärken. In die Blutbahn aufgenommene Salicylsäure kann schädliche Auswirkungen von Methotrexat erhöhen und die blutzuckersenkende Wirkung von Sulfonylharnstoffen verstärken.

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Verrucid nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Verrucid sonst nicht richtig wirken kann!

**Wieviel von Verrucid und wie oft sollten Sie Verrucid anwenden?**

Verrucid wird zweimal täglich auf die zu behandelnden Hautbereiche aufgetragen.

**Wie und wann sollten Sie Verrucid anwenden?**

Die Lösung wird mit dem am Flaschenverschluß angebrachten Pinsel auf Warzen, Hühneraugen und Hornschwielen aufgetragen.

Verrucid ist täglich anzuwenden. Vor jedem neuen Auftragen von Verrucid sollte der vorhandene Pyroxylinfilm entfernt werden.

Verrucid wirkt nur äußerlich und darf nicht eingenommen werden. Bei der Applikation von Verrucid ist darauf zu achten, daß die Lösung nicht auf die gesunde Haut fließt. Falls Augen und Schleimhäute in Kontakt mit Verrucid gekommen sind, sollen diese mit Wasser gespült werden.

**Wie lange sollten Sie Verrucid anwenden?**

Nach erfolgreicher Therapie sollte noch 1 Woche lang weiterbehandelt werden. Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 6 Wochen.

**Anwendungsfehler und Überdosierung****Was ist zu tun, wenn Verrucid in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Als Gegenmaßnahme empfiehlt sich, das überschüssig applizierte Arzneimittel sofort mit warmen Wasser wegzuspülen.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Verrucid angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?*

Die Behandlung, wie vorgesehen, fortsetzen.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?*

Bei vorzeitigem Absetzen des Arzneimittels kann die Verhornungsstörung weiterhin bestehen bleiben.

#### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Verrucid auftreten?*

Nach dem Auftragen kann es zu lokaler Reizung (meistens leichtes Brennen) und in Einzelfällen zu Kontaktallergie kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Bei stärkerer Hautreizung soll Verrucid abgesetzt werden.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

*Wie lange ist Verrucid nach Anbruch des Behältnisses haltbar?*

Nach Öffnen des Behältnisses ist das Arzneimittel bei vorschriftsmäßigem Gebrauch in der Regel 6 Wochen haltbar.

*Wann ist Verrucid auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendbar?*

Verrucid sollte nicht mehr verwendet werden, wenn durch Stehenlassen der offenen Flasche das flüchtige Lösungsmittel weitgehend verdunstet ist.

*Wie ist Verrucid aufzubewahren?*

Die Flasche sollte daher immer gut verschlossen aufbewahrt werden. Der Inhalt ist leicht entflammbar.

Stand der Information: August 2002

GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel

GALEN

#### **Liebe Patientin, lieber Patient!**

Verrucid ist ein Arzneimittel, das bei richtiger Anwendung geeignet ist, eine Reihe von Verhornungsstörungen wie Warzen, Hühneraugen und Schwielen zu beseitigen. Wir möchten Ihnen im folgenden einige Hinweise zur Zusammensetzung und Wirkungsweise geben und Ihnen durch einige Tips die Anwendung erleichtern. Die Inhaltsstoffe von Verrucid haben unterschiedliche Aufgaben, wobei die von der Salicylsäure ausgehende arzneiliche Wirkung durch andere Bestandteile des Arzneimittels und Hilfsstoffe unterstützt wird.

Salicylsäure weicht die Hornhautschicht auf und löst sie ab.

Essigsäure wirkt ätzend auf Warzen und Hühneraugen und fördert das Eindringen von Salicylsäure in die tieferen Hautschichten.

Docusat-Natrium hat zwar einen komplizierten Namen, ist jedoch aus dem Alltag gut bekannt: Es ist in vielen Waschmitteln und Geschirrspülzusätzen enthalten, weil es hartnäckige Verbindungen unterschiedlicher Stoffe aufzulösen vermag (z. B. Schmutz und Gewebe). In Verrucid dient es als Netzmittel und gewährleistet, daß die Lösung selbst in die feinsten Hautspalten eindringt und dort ihre Wirkung entfaltet.

Rizinusöl verhindert als fettes Öl ein zu starkes Austrocknen und Einreißen der Haut durch die Behandlung.

Das gelöste Pyroxylin bildet nach dem Auftragen schnell ein weißes Häutchen auf der Hornschicht, mit dem der Wirkstoff am Ort festgehalten wird.

#### **Die Anwendung**

Bitte lesen Sie die folgenden Zeilen genau durch, denn eine richtige Anwendung ist die Voraussetzung für den bestmöglichen Erfolg:

Wenden Sie Verrucid beim ersten Male abends an. Baden Sie vor der Anwendung Ihre Füße oder Hände (je nach Anwendungsstelle) in einer Seifenlauge: lösen Sie dazu etwas Seife im Handwaschbecken oder einer Schüssel auf.

Nach dem Bad erfolgt die erste Anwendung (siehe Abb.). Hierzu tragen Sie mit dem am Flaschenverschluß befindlichen Pinsel etwas Verrucid auf die betreffende Stelle auf und lassen die Lösung trocknen: Es bildet sich ein weißes Häutchen. Wiederholen Sie die Anwendung zweimal täglich. Jeweils vor erneutem Auftragen von Verrucid sollte der vorhandene Film vorsichtig mit einem Hornhauthobel oder einer Nagelfeile abgetragen werden. Während der Behandlungszeit sollten Sie die Seifenbäder häufiger wiederholen, weil hiernach die durch Verrucid aufgeweichten Hornschichten besonders gut abzulösen sind. Die Anwendungszeit hängt von der Stärke der Verhornung ab; sie beträgt durchschnittlich 6 Wochen.

#### **Weitere Hinweise**

Es gibt leider einige Verhornungsstörungen, die so stark ausgebildet sind oder so tief in die Haut reichen, daß auch sorgfältigste Anwendung von Verrucid nicht zum Erfolg führt. Wenden Sie sich bitte in solchen Fällen an Ihren Arzt bzw. Hautarzt; er wird versuchen, Ihnen auf andere Weise zu helfen.

#### **Achtung!**

Das in Verrucid enthaltene Lösungsmittel kann schnell verdunsten, so daß die Lösung eintrocknet. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, daß Sie die Flasche sofort nach Gebrauch gut verschließen.

