Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

CromoHEXAL® Augentropfen Augentropfen

Wirkstoff: Natriumcromoglicat (Ph.Eur.)

Zusammensetzung
Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 ml Augentropfen enthält 20 mg Natriumcromoglicat (Ph.Eur.).

Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumedetat (Ph.Eur.), Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph.Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), Wasser für Injektionszwecke

Darreichungsform und Inhalt
Originalpackung mit
10 ml (N1) Augentropfen

Kombipackung mit
10 ml (N1) Augentropfen und 15 ml (N1) Nasenspray, Lösung

CromoHEXAL® Augentropfen ist ein Arzneimittel gegen allergische Bindehautentzündung.

HEXAL AG
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller
Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete
Allergisch bedingte, akute und chronische Bindehautentzündung (Konjunktivitis), z. B. Heuschnupfen-Bindehautentzündung, Frühlingskatarrh ([Kerato-] Konjunktivitis vernalis)

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie CromoHEXAL® Augentropfen nicht anwenden?
Sie dürfen CromoHEXAL® Augentropfen nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Natriumcromoglicat, Benzalkoniumchlorid oder einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Beim Menschen gibt es bisher keine Anhaltspunkte für eine fruchtschädigende Wirkung, jedoch reichen die vorhandenen Erfahrungen für eine endgültige Abschätzung des Risikos nicht aus. Der Wirkstoff Natriumcromoglicat wird in geringen Mengen in die Muttermilch ausgeschieden.

CromoHEXAL® Augentropfen sollte daher im ersten Drittel der Schwangerschaft aus Sicherheitsgründen nicht oder nur unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung eingesetzt werden. Auch im weiteren Schwangerschaftsverlauf und während der Stillzeit darf eine Anwendung von CromoHEXAL® Augentropfen nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung durch den behandelnden Arzt erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise
Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?
Unmittelbar nach Anwendung kommt es zu einer kurzfristigen Beeinträchtigung des Sehvermögens.

Bei Entzündungen am Auge, auch bei allergischer Bindehautentzündung, ist der Augenarzt zu befragen, ob trotz der Beschwerden weiterhin Kontaktlinsen getragen werden dürfen. Wenn der Arzt das Tragen von Kontaktlinsen gestattet, ist Folgendes zu beachten:

Nehmen Sie die Kontaktlinsen vor dem Eintropfen heraus, und setzen Sie diese erst 15 Minuten nach dem Eintropfen wieder ein.

Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen.

Wechselwirkungen
Keine bekannt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen

Ihr Arzt CromoHEXAL® Augentropfen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da CromoHEXAL® Augentropfen sonst nicht richtig wirken kann.

Wie oft und wie viele Tropfen CromoHEXAL® Augentropfen sollten Sie anwenden?
Kinder und Erwachsene tropfen 4-mal täglich 1 Tropfen in jedes Auge.

Wie sollten Sie CromoHEXAL® Augentropfen anwenden?
Tropfen Sie CromoHEXAL® Augentropfen in den Bindehautsack des Auges. Dazu beugen Sie den Kopf leicht nach hinten, blicken nach oben und ziehen das Unterlid etwas vom Auge ab. Durch Druck auf das Fläschchen tropfen Sie einen Tropfen CromoHEXAL® Augentropfen in den unteren Bindehautsack. Bringen Sie die Tropföffnung nicht mit dem Auge in Berührung. Nach dem Eintropfen schließen Sie langsam das Auge. Das Fläschchen nach dem Gebrauch sofort verschließen.

Wie lange sollten Sie CromoHEXAL® Augentropfen anwenden?
Sie sollten auch nach dem Abklingen der Beschwerden die Behandlung mit CromoHEXAL® Augentropfen so lange fortführen, wie Sie den allergisierenden Substanzen (Hausstaub, Pilzsporen, Pollen usw.) ausgesetzt sind.

Wenn Sie CromoHEXAL® Augentropfen über einen längeren Zeitraum anwenden wollen, sollten Sie die Notwendigkeit der Behandlung vom Arzt feststellen lassen.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn CromoHEXAL® Augentropfen in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?
Für Natriumcromoglicat sind Vergiftungserscheinungen bisher nicht bekannt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von CromoHEXAL® Augentropfen auftreten?
Selten kann es zu Augenbrennen, Bindehautschwellung (Chemosis), Fremdkörpergefühl sowie zu einer gesteigerten Durchblutung der Bindehaut (konjunktivale Hyperämie) kommen. Im Allgemeinen klingen die Beschwerden spontan ab. Bei stärkeren Beschwerden, insbesondere bei Verdacht auf Überempfindlichkeit gegen CromoHEXAL® Augentropfen ist ein Arzt aufzusuchen.

CromoHEXAL® Augentropfen enthält Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel), das zu Nebenwirkungen, wie z. B. allergischen Reaktionen, führen kann.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Das Arzneimittel soll nach diesem Datum nicht mehr angewendet werden!

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses:
Verwenden Sie CromoHEXAL® Augentropfen nach Anbruch der Flasche nicht länger als 6 Wochen.

Stand der Information

April 2005

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

588519
32300101