

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

MUCOKEHL® D5 Flüssige Verdünnung zur Injektion Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: **Mucor racemosus D5**

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 1 ml flüssige Verdünnung enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 ml **Mucor racemosus D5** aquos. dil. (HAB, Vorschriften 5b und 11).

Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Darreichungsform und Inhalt: 1 / 10 / 50 Ampullen zu 1 ml flüssiger Verdünnung zur i.m., i.v., s.c. oder i.c. Injektion.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung
Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie **MUCOKEHL® D5** nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (**Mucor racemosus**).

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **MUCOKEHL® D5** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **MUCOKEHL® D5** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, wird 2mal wöchentlich 1 ml entweder intracutan, subcutan, intramuskulär oder intravenös injiziert.

Nach Anbruch ist der Rest zu verwerfen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

*Wie lange sollten Sie **MUCOKEHL® D5** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf der Ampulle und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Gebrauchsinformation: 01. 07. 2004.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **MUCOKEHL®** Tropfen, Kapseln, Tabletten, Zäpfchen, Salbe und Augentropfen zur Verfügung.