



Gebrauchsinformation Information für Anwender

Sily-Sabona® eco

Darreichungsform: Hartkapseln
Wirkstoff: Mariendistelfrüchte-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Sily-Sabona® eco jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet folgende Informationen:

1. Was ist Sily-Sabona® eco und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sily-Sabona® eco beachten?
3. Wie ist Sily-Sabona® eco einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sily-Sabona® eco aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Sily-Sabona® eco und wofür wird es angewendet?
1.1 Indikationsgruppe Pflanzliches Arzneimittel bei Lebererkrankungen.
1.2 Anwendungsgebiete Zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen Leberschäden Hinweis: Die Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol). Bei Gelbsucht (hell- bis dunkelgelbe Hautverfärbung, Gelbfärbung des Augenweiß) ist Rücksprache mit dem Arzt erforderlich. Dieses Arzneimittel ist nicht zur Behandlung von akuten Vergiftungen geeignet.
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sily-Sabona® eco beachten?
2.1 Sie dürfen Sily-Sabona® eco keinesfalls einnehmen: bei bekannter Allergie gegen Mariendistelfrüchte oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Sily-Sabona® eco ist erforderlich: Bei Kindern: Sily-Sabona® eco soll nicht angewendet werden bei Kindern unter 12 Jahren, da ausreichende Untersuchungen für die Anwendung bei Patienten dieser Altersgruppe nicht vorliegen. In Schwangerschaft und Stillzeit: Es liegen keine ausreichenden Untersuchungen zur Anwendung von Sily-Sabona® eco während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Sily-Sabona® eco soll deshalb bei Schwangeren und stillenden Müttern nicht angewendet werden. Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bei Einnahme von Sily-Sabona® eco mit anderen Arzneimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden/einnehmen bzw. vor kurzem angewendet/eingenommen haben. Dies müssen Sie auch beachten, wenn Sie nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel anwenden/einnehmen.
Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Sily-Sabona® eco:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Sily-Sabona® eco erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Sily-Sabona® eco einzunehmen? Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Sily-Sabona® eco nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Sily-Sabona® eco sonst nicht richtig wirken kann. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
3.1 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren beträgt die Tagesdosis: 3mal täglich 1 Sily-Sabona® eco Hartkapsel
3.2 Art der Anwendung: Die Hartkapseln können unzerkaut oder zerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) mehrmals täglich wie oben angegeben eingenommen werden. Sily-Sabona® eco soll nicht im Liegen eingenommen werden.





3.3 Dauer der Anwendung:

Die Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt; über die Dauer der Anwendung sollte jedoch der Arzt entscheiden. Sollten trotz der Einnahme von Sily-Sabona® eco die Beschwerden fortbestehen, sollte der Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Sily-Sabona® eco zu stark oder zu schwach ist.

3.4 Wenn Sie eine größere Menge Sily-Sabona® eco eingenommen haben als Sie sollten:

Bei Einnahme zu großer Mengen von Sily-Sabona® eco, können die beschriebenen Nebenwirkungen im verstärkten Maße auftreten. Beim Verdacht einer Überdosierung mit Sily-Sabona® eco informieren Sie bitte Ihren Arzt.

3.5 Wenn Sie die Einnahme von Sily-Sabona® eco vergessen haben:

Wenn Sie Sily-Sabona® eco einmal vergessen haben zu nehmen, oder zu wenig eingenommen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Einnahme, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

3.6 Wenn Sie die Einnahme von Sily-Sabona® eco abbrechen:

Sily-Sabona® eco sollte regelmäßig eingenommen werden. Bitte brechen Sie die Behandlung mit Sily-Sabona® eco nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab. Ihre Krankheit könnte sich hierdurch verschlechtern.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Sily-Sabona® eco Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	Mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	Weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	Weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	Weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	Weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

4.1 Bedeutsame Nebenwirkungen und Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von den nachfolgenden Nebenwirkungen betroffen sind, müssen Sie Sily-Sabona® eco **absetzen** und **Kontakt mit einem Arzt aufnehmen**.

Sehr selten

- Vereinzelt wird eine leicht abführende Wirkung sowie eine gesteigerte Harnbildung und -ausscheidung beobachtet.

Sollten Sie die genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, soll Sily-Sabona® eco nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist Sily-Sabona® eco aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Seitenfläche der Faltschachtel und auf dem Blister aufgedruckt. Bitte verwenden Sie Sily-Sabona® eco nicht mehr nach diesem Datum.

5.1 Aufbewahrungsbedingungen

In der Originalpackung nicht über 25°C aufbewahren!

6. Weitere Informationen

Was Sily-Sabona® eco enthält:

Der Wirkstoff ist: Mariendistelfrüchte-Trochenextrakt

1 Hartkapsel enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

136 - 160 mg Tockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (50-70:1), entsprechend 86,5 mg Silymarin (berechnet als Silibinin, HPLC); Auszugsmittel: Aceton

Die sonstigen Bestandteile sind:

Hochdisperses Siliciumdioxid, Dextrin, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Gelatine, Natriumdodecylsulfat.

Wie Sily-Sabona® eco aussieht und Inhalt der Packung:

Sily-Sabona® eco sind gelbe Kapseln in Blistern verpackt.

Sily-Sabona® eco ist erhältlich in Originalpackungen mit 100 Hartkapseln (N3).

Pharmazeutischer Unternehmer

MIT Gesundheit GmbH

47533 Kleve

Postanschrift:

Sabona Naturarzneimittel

Flutstraße 74

47533 Kleve

Tel.: 0 28 21 - 72 77 0

Fax: 0 28 21 - 72 77 40

Email: info@mit-gesundheit.com

Hersteller

C.P.M. ContractPharma GmbH & Co KG

Frühlingstraße 7

83620 Feldkirchen-Westerham

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:

Juli 2007

0-00569-01

