



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

cutistad® Spray

Wirkstoff: Clotrimazol

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 ml Lösung enthält 0,01 g Clotrimazol

Sonstige Bestandteile: Macrogol 400, Propan-2-ol, Propylenglycol

Darreichungsform und Inhalt

Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung
Originalpackung mit 30 ml Lösung (N1)

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Anti-Pilzmittel (Antimykotikum)

Pharmazeutischer Unternehmer: STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259, Internet: www.stada.de

Hersteller: STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Anwendungsgebiete

Bei Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere wie Malassezia furfur, z. B. in Form von:

- Mykosen der Füße (Fußpilz), der Haut und Hautfalten
- oberflächlichen Candidosen
- Kleienpilzflechte (Pityriasis versicolor).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie cutistad® Spray nicht anwenden?

cutistad® Spray darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile von cutistad® Spray sind.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Macrogol, Propan-2-ol oder Propylenglycol kann eine von vorgenannten Substanzen freie Darreichungsform angewendet werden. (Anstelle des Sprays z. B. cutistad® Creme verwenden.)

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Clotrimazolhaltige Präparate sollten im 1. bis 3. Schwangerschaftsmonat nicht großflächig (nicht mehr als 30% Körperoberfläche) angewendet werden, da eine epidemiologische Studie Hinweise auf eine erhöhte Frühgeburtsrate nach vaginaler Anwendung von Clotrimazol in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft ergeben hat.

Um den direkten Kontakt des Säuglings mit Clotrimazol zu vermeiden, sollte cutistad® Spray von Stillenden nicht im Brustbereich angewendet werden.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

cutistad® Spray ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. cutistad® Spray darf nicht auf Schleimhäute oder in die Augen gelangen. Zur Behandlung von Pilzinfektionen im Genitalbereich ist cutistad® Spray nicht geeignet. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.



Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden ihn an:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu cutistad® Spray interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.





Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von cutistad® Spray oder werden selbst in ihrer Wirkung durch cutistad® Spray beeinflusst?

Durch den Wirkstoff Clotrimazol vermindert cutistad® Spray die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyantibiotika wie Nystatin und Natamycin.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt cutistad® Spray nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da cutistad® Spray sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft sollten Sie cutistad® Spray anwenden?

cutistad® Spray wird 2–3-mal täglich angewendet.

Wie sollten Sie cutistad® Spray anwenden?

Die Lösung wird auf die erkrankten Hautpartien aufgesprüht.

Wie lange sollten Sie cutistad® Spray anwenden?

Für den Behandlungserfolg ist eine regelmäßige und ausreichend lange Anwendung wichtig. Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich; sie hängt vom Ausmaß und der örtlichen Lage der Erkrankung ab. Um eine komplette Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nicht nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Symptome oder subjektiven Beschwerden abgebrochen, sondern bis zu einer Dauer von mindestens 4 Wochen fortgeführt werden.

Kleienpilzflechte (Pityriasis versicolor) heilt im Allgemeinen in 1–3 Wochen ab.

Bei Fußpilz sollte – um Rückfällen vorzubeugen – trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiterbehandelt werden. Nach jedem Waschen sollten die Füße gründlich abgetrocknet werden (Zehenzwischenräume).

Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig cutistad® Spray angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie am folgenden Tag bitte nicht die doppelte Menge von cutistad® Spray an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker die weitere Vorgehensweise, da in beiden Fällen der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von cutistad® Spray auftreten?

Störungen des Immunsystems

Allergische Reaktionen bei Überempfindlichkeit gegen Macrogol bzw. Propan-2-ol.

Störungen der Haut und Hautanhangsgebilde

Hautreaktionen (vorübergehende Rötung, Brennen oder Stechen).

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist cutistad® Spray aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über + 30°C aufbewahren.

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses:

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Stand der Information:

1. Juni 2005

9212022 0505

 STADA



Name:

PLZ/Ort:

Vorname:

E-Mail:

Straße:

Geburtsdatum:

