

Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan Homöopathisches Arzneimittel

Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan beachten?
3. Wie ist Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan und wofür wird es angewendet?

Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Krampfhusten.

Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan beachten?

Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan darf nicht eingenommen werden

bei Chromüberempfindlichkeit sowie wegen des Alkoholgehaltes auch nicht bei Alkoholkranken.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern bis 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit soll wegen des Alkoholgehaltes Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Bei Einnahme von Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan:

Dieses Arzneimittel enthält 47 Vol.-% Alkohol.

In der Einzeldosierung von 10 Tropfen sind 0,16 ml Ethanol enthalten. Die Alkoholmenge von 10 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht etwa 3,2 ml Bier, 1,3 ml Wein oder 80 ml Apfelsaft.

3. Wie ist Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan einzunehmen?

Nehmen Sie Bronchialtropfen II nach Dr. med. E.

bitte wenden

Stefan immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5 – 10 Tropfen ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1 bis 3mal täglich jeweils 5 - 10 Tropfen ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan eingenommen haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Einnahme von sehr großen Mengen ist jedoch der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

In einzelnen Fällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesins-

titut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/anzweil.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen Was Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan enthält:

10 g (10,7 ml) enthalten an Wirkstoffen:

1,6 g Cuprum aceticum Dil. D6, 1,6 g Dactylopius coccus Dil. D2, 1,6 g Hyoscyamus niger Dil. D4, 1,6 g Kalium bichromicum Dil. D6, 1,6 g Kalium stibyltartaricum Dil. D6; Bestandteile 1 - 5 über die letzte Verdünnungsstufe gemeinsam mit Ethanol 43 % (m/m) potenziert.

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 30% (m/m)

1 g entspricht 28 Tropfen

Wie Bronchialtropfen II nach Dr. med. E. Stefan aussieht und Inhalt der Packung:

Tropfflasche aus Braunglas mit einer klaren, rötlichen Flüssigkeit

Originalpackung mit 30 ml (N1) Mischung zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Infirmarius GmbH

Daimlerstraße 19, D-73037 Göppingen

Tel.: +49 7161 6 06 94-0

Fax: +49 7161 6 06 94-90

E-Mail: info@infirmarius.de

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im August 2023 überarbeitet.

