Gebrauchsinformation

Liebe Patientin.

bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/ Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.



Antifungol® HEXAL® 1 Vaginalcreme

Wirkstoff: Clotrimazol Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

5 g Vaginalcreme enthalten 500 mg Clotrimazol.

Sonstige Bestandteile:

Alkyl(\overline{C}_{12} - \overline{C}_{12})(dodecanoat, tetradecanoat, palmitat, stearat), Benzylalkohol, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), dickflüssiges Paraffin, Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 5 g (N1) Vaginalcreme und Einmal-Applikator zur 1-Dosis-Behandlung

Antifungol* HEXAL* 1 Vaginalcreme ist ein Mittel zur Behandlung von Pilzerkrankungen der Scheide.

HEXAL AG

Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen Tel.: (08024) 908-0, Fax: (08024) 908-1290 e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller

Salutas Pharma GmbH ein Unternehmen der HEXAL AG Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete

Infektiöser Ausfluss, verursacht durch Hefepilze, Entzündungen der Scheide und Ausfluss durch Pilze - meist Candida - sowie Superinfektionen mit Clotrimazol-empfindlichen Bakterien.

<u>Gegenanzeigen</u>

Wann dürfen Sie Antifungol' HEXAL 1 Vaginalcreme nicht anwenden?

Sie dürfen Antifungol* HEXAL* 1 Vaginalcreme nicht anwenden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich auf den Wirkstoff Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile reagieren.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol empfiehlt es sich, anstelle der Vaginalcreme eine cetylstearylalkoholfreie Darreichungsform (z. B. Vaginaltabletten) zu verwenden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft beachten?

Antifungol* HEXAL* 1 Vaginalcreme sollte aus Vorsicht nicht in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten angewendet werden. Während der Schwangerschaft sollte die Behandlung mit der Vaginalcreme durch den Arzt erfolgen oder mit Vaginaltabletten durchgeführt werden, da diese ohne Applikator anwendbar sind.

Was ist bei Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen? Antifungol' HEXAL' 1 Vaginalcreme soll nicht bei Patientinnen unter 18 Jahren angewendet werden, da für diese Altersgruppe keine entsprechenden Untersuchungen vorliegen.

<u>Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise</u> Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden? Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Bei der Behandlung mit Antifungol' HEXAL* 1 Vaginalcreme kann es wegen des Hilfsstoffes Paraffin bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit der Kondome kommen. Bitte verwenden Sie deshalb während der Behandlung andere Verhütungsmethoden.

<u>Wechselwirkungen</u>

Welche anderen Arzneimittel werden von Antifungol' HEXAL' 1 Vaginalcreme beeinflusst?

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von anderen Arzneimitteln, die ebenfalls zur Behandlung von Pilzerkrankungen angewendet werden (Amphotericin und andere Polyenantibiotika wie Nystatin und Natamycin).

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Antifungol' HEXAL* 1 Vaginalcreme nicht anders verordnet hat.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Antifungol* HEXAL* 1 Vaginalcreme sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von und wie oft sollten Sie Antifungol* HEXAL* 1 Vaginalcreme anwenden?

Sie wenden zur 1-Dosis-Behandlung einmal abends eine Applikatorfüllung (ca. 5 g) an.

Wie sollten Sie Antifungol' HEXAL' 1 Vaginalcreme anwenden? Der gefüllte Einmal-Applikator wird, am Besten in Rückenlage, bei leicht angezogenen Beinen möglichst tief in die Scheide entleert.

Die Behandlung sollte zweckmäßigerweise nicht während der Menstruation durchgeführt werden bzw. vor deren Beginn abgeschlossen sein.

Wie lange sollten Sie Antifungol' HEXAL' 1 Vaginalcreme anwenden?

Falls die äußeren Anzeichen der Erkrankung (z.B. Ausfluss, Juckreiz) nach der 1-Dosis-Behandlung nicht vollständig abgeklungen sind, ist der Arzt aufzusuchen.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Antifungol' HEXAL' 1 Vaginalcreme auftreten?

Gelegentlich können Hautreaktionen (z. B. Brennen, Stechen, Rötung) vorkommen.

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Schleimhaut auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, tellen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung und dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!


Stand der Information:

Dezember 2004

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

<u>Anwendung der Vaginalcreme mit Einmal-Applikator</u>

- Den weißen Kolben etwa 1 cm aus dem transparenten Rohr herausziehen und das transparente Rohr auf die geöffnete Tube aufsetzen
- Durch vorsichtiges Drücken der Tube wird der Applikator gefüllt, bis der weiße Kolben fast vollständig aus dem transparenten Rohr herausgeschoben ist
- Applikator von der Tube abnehmen, möglichst tief in die Scheide einführen (am Besten in Rückenlage) und durch Druck auf den weißen Kolben entleeren
- 4. Nach Gebrauch Applikator entfernen und wegwerfen









- WICHTIGE INFORMATION FÜR IHRE GESUNDHEIT -

Was Sie über Ihre Erkrankung wissen sollten:

Pilze kommen überall in der Ümwelt vor. Unter bestimmten Bedingungen können sie eine Infektion auslösen, z.B. auch im Genitalbereich. Dabei handelt es sich nicht um eine Geschlechtskrankheit. Die Erkrankung ist nicht gefährlich und kann mit modernen Arzneimitteln schnell und zuverlässig behandelt werden.

Wenn Sie häufiger an einer Pilzinfektion leiden, sollten Sie sich bewusst ernähren und auf größere Mengen Süßigkeiten verzichten, da Pilze Zucker lieben.

Was Sie über die Behandlung mit diesem Arzneimittel wissen sollten:

Antifungol® HEXAL® 1 Vaginalcreme wirkt gegen praktisch alle in Frage kommenden Pilzarten, die eine Infektion im Genitalbereich auslösen können. Beschwerden wie Juckreiz und Ausfluss verschwinden meistens nach kurzer Zeit.

Sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Partner über Ihre Erkrankung. Eine Mitbehandlung kann sinnvoll sein, um eine gegenseitige Ansteckung zu verhindern. Dafür stehen geeignete Arzneimittel zur Verfügung. Fragen Sie Ihren Arzt.

Was Sie zusätzlich für Ihre Gesundheit tun können:

Auf die tägliche Körperpflege sollten Sie natürlich auf keinen Fall verzichten, wohl aber auf übertriebene Hygienemaßnahmen wie z. B. die Benutzung von Intimsprays und zu häufige heiße Bäder mit parfümierten Badezusätzen. Verwenden Sie für die tägliche Reinigung viel Wasser und eine milde Seife. Wechseln Sie Ihre eigenen Waschlappen und Handtücher täglich, ebenfalls Ihre Unterwäsche, die unbedingt aus Naturfasern sein sollte. Zu enge Strumpfhosen und Jeans sollten Sie meiden, da sie ein feuchtwarmes Klima schaffen, und das mögen und brauchen die Pilze zur Vermehrung. Nach der Toilettenbenutzung sollte mit dem Toilettenpapier von der Scheidenöffnung in Richtung Darmausgang gereinigt werden. Pilze, die im Darm vorkommen, können auf diese Weise nicht in die Scheide gelangen.

Wenn Sie diese Empfehlungen berücksichtigen, haben Sie gute Aussichten, auf Dauer Ihre Pilzerkrankung loszuwerden.