

* 7 3 6 5 5 9 5 0 *

Biochemie Nr. 11 Silicea D6

Biochemisches Funktionsmittel Nr. 11 nach Dr. Schüßler
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
Wirkstoff: Silicea D6 Trit. 250 mg
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 8555.55.53 Inhalt: 100 Tabletten
Ch.-B.: 1777 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
Biochemie Nr. 11 Silicea D6
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten
Originalpackung mit 100, 400 und 1000 Tabletten
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biochemie Nr. 11 Silicea D6 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten im Mund zergehen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite.
Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn Biochemie Nr. 11 Silicea D6 in zu großen Mengen eingenommen wurde? Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite.
Stand der Information: März 2016



Biochemie Nr.
11
Silicea
D12

Biochemisches Funktionsmittel Nr. 11 nach Dr. Schüßler
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
Wirkstoff: Silicea D12 Trit. 250 mg
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 8555.55.53 Inhalt: 100 Tabletten
Ch.-B.: 1777 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
Biochemie Nr. 11 Silicea D12
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten
Originalpackung mit 100, 400 und 1000 Tabletten
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten? Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit
dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie
Biochemie Nr. 11 Silicea D12 daher erst nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt
ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber
bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und
Kinder ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe
bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten im Mund zergehen.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung
sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch
erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1
Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der
Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite.
Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn Biochemie Nr. 11 Silicea D12
in zu großen Mengen eingenommen wurde?
Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels
kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglich-
keit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden
kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels: siehe Rückseite.
Stand der Information: März 2016