

Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Hinweise zur Anwendung Ihrer Arzneimittel geben.

**Das von Ihnen bestellte oben genannte Arzneimittel dient der kurzzeitigen Behandlung von Schlafstörungen.**

**Bitte beachten Sie:**

Zum Schutz Ihrer Gesundheit sollten Sie dieses Arzneimittel nicht über einen längeren Zeitraum anwenden. Sollten sich Ihre Beschwerden innerhalb von 2 Wochen nicht gebessert haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt!

Wenn Sie unter bestimmten Augenerkrankungen (Engwinkelglaukom) leiden, die mit erhöhtem Augeninnendruck einhergehen, nehmen Sie dieses Arzneimittel nicht ohne Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt ein. Das o. g. Arzneimittel kann den Augeninnendruck zusätzlich erhöhen.

Außerdem kann dieses Arzneimittel die Entleerung der Blase behindern und ist somit für Männer, die unter einer gutartigen Vergrößerung der Prostata mit Restharnbildung leiden, ungeeignet. Daher empfehlen wir Ihnen, eine gleichzeitige Behandlung nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt zu beginnen.

Weiterhin kann es bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen. Meiden Sie während der Anwendung dieses Arzneimittels den Konsum von Alkohol (auch die Einnahme alkoholhaltiger Arzneimittel), da hierdurch unerwünschte Wirkungen wie Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens (z. B. im Straßenverkehr) verstärkt auftreten können.

Gerne beraten wir Sie über mögliche Alternativen und unterstützende Maßnahmen bei Schlafstörungen.