

Gebrauchsinformation

Unguentum Zinci „Lexer“ SR

10 % ige Salbe zur Anwendung auf der Haut

Dermatikum

Wirkstoff: Zinkoxid

Anwendungsgebiete

Zinkoxid wirkt abdeckend-protectiv und sekretbindend bei akuten und subakuten Dermatosen (Hautkrankheiten).

Gegenanzeigen

Unguentum Zinci „Lexer“ SR darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Zink, Wollwachsalkoholen oder anderen Bestandteilen der Salbe sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Großflächige Anwendung auf Hautarealen von mehr als 20 Prozent der Körperoberfläche vermeiden.

Nicht mit Augen oder Schleimhaut in Berührung bringen.

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, können Sie Unguentum Zinci „Lexer“ SR bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Dosierungsanleitung in der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Doch sollte eine großflächige Anwendung, insbesondere an der Brust bei stillenden Frauen, vermieden werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Zinkoxid-haltige Rückstände von der betreffenden Hautpartie vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernen, da die Wirkung anderer Dermatika beeinträchtigt werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Mehrmals täglich, bei Säuglingen zu jedem Windelwechsel, auf die betroffenen Hautstellen auftragen und gegebenenfalls mit Mull abdecken.

Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Besonders im Kindesalter sind bei versehentlicher Einnahme Übelkeit, Erbrechen, Gastritis und Fieber möglich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen

Gelegentlich (1-10 von 1000) Hautrötungen. Bei Überempfindlichkeit gegen Wollwachsalkohole können Rötungen und Hautentzündungen (Ekzem) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Präparat soll nach Ablauf des aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch 3 Monate verwendbar.

Nicht über 25 °C und stets im Originalbehältnis aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung

100 g Salbe enthalten:

Wirkstoff: Zinkoxid 10,0 g

Sonstige Bestandteile: Gelbes Vaseline, Klauenöl, Sorbitantrioleat GOT, Wollwachsalkohole, Gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 50 g (N1) bzw. 100 g (N2) Salbe zur Anwendung auf der Haut.

Pharmaz. Unternehmer/Hersteller

Pharmachem GmbH & Co. KG

Pharmachem Straße 1

07381 Pößneck/Thüringen

Tel.: 036738 / 659272 Fax: 036738 / 659274

Stand der Information

Februar 2018

50 g (N1)

<100 g (N2)>

Ch.-B.: <>

Verwendbar bis: <>

Apothekenpflichtig!

Zul.-Nr.: 3004442.00.00

<PZN>