

* 9 8 4 4 8 4 4 0 *

64
Mercur.
solub.
F Komplex
Homöopathisches
Arzneimittel

Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Mercurius solubilis
Hahnemanni Trit. D8, Ignatia Trit. D4, Kalium bichromicum
Trit. D4, Natrium nitricum Trit. D3, Selenium Trit. D5,
Spongia Trit. D3 je 22,5 mg. Sonstige Bestandteile:
Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen
ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 2513005.00.00 Inhalt: 120 Tabletten
Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
64 Mercur. solub. F Komplex Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation. Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 64 Mercur. solub. F Komplex nicht einnehmen?
64 Mercur. solub. F Komplex soll bei Chromüberempfindlichkeit
und bei Jodüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.
Wann dürfen Sie 64 Mercur. solub. F Komplex erst nach
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
64 Mercur. solub. F Komplex soll bei Schilddrüsenerkrankungen
nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte
das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach
Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine
ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei
Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Was müssen Sie vor der Anwendung von 64 Mercur. solub. F
Komplex beachten?
Besondere Vorsicht bei der Anwendung von 64 Mercur. solub. F
Komplex ist erforderlich. Wichtige Warnhinweise über bestimmte
Bestandteile von 64 Mercur. solub. F Komplex. Diese Arzneimittel
enthält Lactose. Bitte nehmen Sie 64 Mercur. solub. F Komplex
daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen
bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis
ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette vor bzw.
zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Eine über eine Woche
hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem
homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette
einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der
Anwendung zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite.
Ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche einnehmen.
Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn 64 Mercur. solub. F Komplex in zu großen
Mengen eingenommen wurde? Bei der Einnahme größerer

Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit
Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu
Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende
Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen:
Nach Anwendung können verstärkt Speichelfluss oder in
Einzelfällen Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist dann
abzusetzen.
Wegen des Bestandteils „Mercurius“ (Quecksilber) können
gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Hinweis: siehe
Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:
siehe Rückseite. Das Arzneimittel ist nach Anbruch des
Behältnisses 6 Monate haltbar.
Stand der Information: Juli 2016