

\* 0 4 4 8 4 5 7 8 \*



**102**

# Kreosotum F Komplex

Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:**  
10 g (= 10,83 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Acidum oxalicum Dil. D4, Kreosotum Dil. D4, Acidum nitricum Dil. D4, Dulcamara Dil. D3, Aletris farinosa Dil. D3, Kalium carbonicum Dil. D4, Kalium jodatum Dil. D3, Ustilago maydis Dil. D4, Pulsatilla Dil. D4 je 1,1111 g  
Dieses Präparat enthält 55,0 Vol.-% Alkohol.  
Packungsbeilage beachten!  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 2512454.00.00  
**Ch.-B.: 0000**

Inhalt: 50 ml  
**Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**102 Kreosotum F Komplex**  
Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 22 Tropfen

**Anwendungsgebiete:**  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Hinweise: siehe Rückseite.

**Gegenanzeigen:**  
Wann dürfen Sie 102 Kreosotum F Komplex nicht einnehmen?  
102 Kreosotum F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei Alkoholkranken sowie bei einer Jodüberempfindlichkeit nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 102 Kreosotum F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
102 Kreosotum F Komplex soll bei Schilddrüsenerkrankungen sowie wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
Warnhinweis:  
Dieses Arzneimittel enthält 55,0 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,64 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,32 g Alkohol zugeführt.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.  
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?  
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.  
**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen.  
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:**  
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** siehe Rückseite  
**Stand der Information:** April 2016