


\* 5 1 6 4 8 4 4 0 \*



# 106 Yerba santa

F Komplex  
Homöopathisches  
Arzneimittel

**Mischung zum Einnehmen**  
**Zusammensetzung:** 10 g (= 10,95 ml) Mischung enthalten:  
Arzneilich wirksame Bestandteile: Anisum (HAB 1934) Dil. D4  
[HAB, Vorschr. 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)], Yerba santa Dil.  
D3, Sanguinaria Dil. D6, Cactus Dil. D2, Ipecacuanha Dil. D4,  
Lobelia inflata Dil. D4, Drosera Dil. D2, Pimpinella alba (HAB 1934)  
Dil. D2 (HAB, Vorschr. 3a), Spongia Dil. D4, Sulfur Dil. D6 je 1 g  
Dieses Präparat enthält 58,9 Vol.-% Alkohol.  
Packungsbeilage beachten!  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer  
therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden  
Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!  
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig  
Reg.-Nr.: 2512450.00.00 Inhalt: 50 ml  
**Ch.-B.: 0000** **Verwendbar bis 00/0000**

**Gebrauchsinformation**  
**106 Yerba santa F Komplex**  
Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml  
1 g entspricht 22 Tropfen  
**Anwendungsgebiete:**  
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Hinweise: siehe Rückseite.  
**Gegenanzeigen:**  
Wann dürfen Sie 106 Yerba santa F Komplex nicht  
einnehmen?  
Wegen des Alkoholgehaltes soll 106 Yerba santa F Komplex  
bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 106 Yerba santa F Komplex erst nach  
Rücksprache mit dem Arzt anwenden?  
106 Yerba santa F Komplex soll bei  
Schilddrüsenerkrankungen sowie wegen des Alkoholgehaltes  
bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen  
Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem  
Arzt angewendet werden.  
**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**  
Warnhinweis:  
Dieses Arzneimittel enthält 58,9 Vol.-% Alkohol.  
Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung  
werden bei der Akutdosierung bis zu 0,70 g Alkohol und bei  
der chronischen Dosierung bis zu 0,35 g Alkohol zugeführt.  
Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,  
Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die  
Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder  
verstärkt werden.  
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit  
beachten?  
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen,  
sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur  
nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.  
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:  
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine  
ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb  
bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.  
**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite  
**Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle  
halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen  
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser  
einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat  
nicht länger als 1 Woche erfolgen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit  
einem Teelöffel Wasser einnehmen.  
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der  
Einnahme zu reduzieren.  
**Dauer der Anwendung:** siehe Rückseite  
**Nebenwirkungen:**  
Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.  
**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**  
siehe Rückseite  
**Stand der Information:** April 2016