


* 4 4 4 6 4 4 8 4 4 4 0 *



123

Ignatia
F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 10,85 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Actaea Dil. D3, Ignatia Dil. D4, Sepia Dil. D8, Valeriana Dil. D3, Yucca filamentosa Dil. D2 je 2,0 g

Dieses Präparat enthält 54,8 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.

Reg.-Nr.: 2512439.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

123 Ignatia F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 123 Ignatia F Komplex nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 123 Ignatia F Komplex bei

Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 123 Ignatia F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 123 Ignatia F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 54,8 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bei der Akutdosierung bis zu 0,64 g Alkohol und

bei der chronischen Dosierung bis zu 0,32 g Alkohol

zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,

Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

siehe Rückseite

Stand der Information: November 2017