


*
7
4
2
6
6
5
4
0
*



85

Cina

F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 11,00 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:

Cina D3 Dil., Pyrethrum (HAB 1934) D3 Dil. [HAB, Vorschr. 4a Ø mit

Ethanol 62 % (m/m)], Filix D3 Dil., Spigelia D4 Dil., Stannum chloratum

D8 Dil. (HAB, Vorschr. 6), Pinus silvestris D2 Dil., Tellurium D8 Dil. (HAB,

Vorschr. 6), Senecio aureus D5 Dil., Frangula D2 Dil., Cucurbita pepo

(HAB 1934) D2 Dil. (HAB, Vorschr. 3a) je 1 g

Dieses Präparat enthält 60,9 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer

therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden

Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren

Reg.-Nr.: 2513045.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

85 Cina F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 85 Cina F Komplex nicht einnehmen?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 85 Cina F Komplex bei

Alkoholkranken nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 85 Cina F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 85 Cina F Komplex bei

Leberkranken, Epileptikern und Personen mit

organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach

Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und

Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 60,9 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bis zu 0,37 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei

Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,

Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für

Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer

Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit

vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache

mit dem Arzt angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen

keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es

soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht

angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen

vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel

Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der

Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des

Arzneimittels: siehe Rückseite

Stand der Information: Dezember 2018