

Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss „Zinkoxid-Creme 25% SR“ jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Zinkoxid-Creme 25% SR (NRF 11.109.)

Lotio Zinci oxidati SR

Wirkstoff: Zinkoxid

Zusammensetzung:

100g Suspension enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Zinkoxid 25,0 g

Sonstige Bestandteile: (2-Ethylhexyl)dodecanoat, Glycerol 85%, nichtionische emulgierende Alkohole (Gemisch aus Cetylstearylalkohol, Macrogol-80-cetylstearylether und Glycerolmonostearat), Kaliumsorbat (Ph.Eur.), Citronensäure, gereinigtes Wasser.
(O/W-Emulsion)

Darreichungsform und Inhalt

Suspension zur Anwendung auf der Haut.

Salbendose zu 100g

Stoff- oder Indikationsgruppe

Dermatikum

Anwendungsgebiete

Zinkoxid wirkt abdeckend-protektiv und sekretbindend bei akuten und subakuten Dermatosen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie „Zinkoxid-Creme 25% SR“ nicht anwenden?

- Überempfindlichkeit gegen Zink oder andere Bestandteile (siehe nachfolgende Warnhinweise).
- Großflächige Anwendung auf Hautarealen von mehr als 20 Prozent der Körperoberfläche.

Name des pharmazeutischen Unternehmers/Herstellers

PKH GmbH
Daniel-Vorländer-Str. 2
06120 Halle

Tel.: 0345/29978-0
www.apomix.de

Fax: 0345/29978-19
info@apomix.de

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

„Zinkoxid-Creme 25% SR“ ist nicht zur Behandlung nässender Hauterkrankungen geeignet.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von „Zinkoxid-Creme 25%SR“

Kaliumsorbat sowie Cetylstearylalkohol (Bestandteil der nichtionischen emulgierenden Alkohole) können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Zinkoxidhaltige Rückstände von der betreffenden Hautpartie vor der Anwendung anderer Dermatika vollständig entfernen, da die Wirkung anderer Dermatika beeinträchtigt werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

2- bis 3-mal täglich auf die betroffene Stelle auftragen und antrocknen lassen.

Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Auf großen Hautarealen (über 20% der Körperoberfläche) nicht anwenden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von „Zinkoxid-Creme 25% SR“ auftreten?

Wie alle Arzneimittel kann „Zinkoxid-Creme 25% SR“ Nebenwirkungen haben. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden nebenstehende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:	<i>sehr häufig:</i>	mehr als 1 von 10 Behandelten
	<i>häufig:</i>	mehr als 1 von 100 Behandelten
	<i>gelegentlich:</i>	mehr als 1 von 1.000 Behandelten
	<i>selten:</i>	mehr als 1 von 10.000 Behandelten
	<i>sehr selten:</i>	1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

Nach Auftragen von „Zinkoxid-Creme 25% SR“ auf stark entzündliche Hautstellen kann gelegentlich ein leichtes Brennen auftreten.

In seltenen Fällen Auftreten von allergischen Reaktionen. Gelegentlich Hautrötungen, Spannungsgefühl, Austrocknungserscheinungen, raue Haut und akantnotische Hautveränderungen (Absetzen der Therapie empfohlen).

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Präparat soll nach Ablauf des aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nicht über 25°C aufbewahren!

Reste der Lotion auf der Haut sollten überpinselt und nicht abgerieben werden, um eine mechanische Irritation der Haut zu vermeiden.

Stand der Information: September 2005