


* 0 4 7 7 9 0 3 *



282

Euphrasia
F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen
Zusammensetzung:
10 g (= 10,67 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Euphrasia D2 Dil., Aloe D4 Dil., Capsicum D4 Dil., Hepar sulfuris D8 Dil., Magnesium chloratum D3 Dil., Kalium sulfuricum D3 Dil., Ruta D3 Dil., Spigelia D4 Dil. je 1,1111 g
Sonstiger Bestandteil: Ethanol 43 % (m/m)
Dieses Präparat enthält 47,4 Vol.-% Alkohol.
Packungsbeilage beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Apothekenpflichtig Nicht über 25°C aufbewahren.
Reg.-Nr.: 2513019.00.00 Inhalt: 50 ml

Ch.-B.: 0000 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
282 Euphrasia F Komplex
Homöopathisches Arzneimittel
Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml
1 g entspricht 20 Tropfen.

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:
Wann dürfen Sie 282 Euphrasia F Komplex nicht einnehmen?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 282 Euphrasia F Komplex bei Alkoholkranken nicht angewendet

werden.
Wann dürfen Sie 282 Euphrasia F Komplex erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?
Wegen des Alkoholgehaltes soll 282 Euphrasia F Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:
Warnhinweis:
Dieses Arzneimittel enthält 47,4 Vol.-% Alkohol. Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bis zu 0,30 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12

Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet 1-3mal täglich 5 Tropfen vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.
Dauer der Anwendung: siehe Rückseite
Nebenwirkungen: Keine bekannt. Siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe Rückseite
Stand der Information: November 2017