

# Livocab™ - Augentropfen

Wirkstoff: Levocabastin  
(vorliegend als Levocabastinhydrochlorid)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage (Gebrauchsinformation) sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Livocab-Augentropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

- ❶ Was sind Livocab-Augentropfen und wogegen werden sie angewendet?
- ❷ Was müssen Sie vor der Anwendung von Livocab-Augentropfen beachten?
- ❸ Wie sind Livocab-Augentropfen anzuwenden?
- ❹ Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- ❺ Wie sind Livocab-Augentropfen aufzubewahren?
- ❻ Woraus bestehen Livocab-Augentropfen?
- ❼ Wie und von wem sind Livocab-Augentropfen erhältlich?
- ❽ Weitere Angaben

## ❶ Was sind Livocab-Augentropfen und wogegen werden sie angewendet?

Livocab-Augentropfen ist ein Arzneimittel zur Behandlung allergischer Bindehautentzündungen.

Livocab-Augentropfen werden angewendet zur Behandlung der Beschwerden einer allergisch ausgelösten Entzündung der Bindehaut, z. B. Heuschnupfen oder dem sogenannten Frühlingskatarrh.

## ❷ Was müssen Sie vor der Anwendung von Livocab-Augentropfen beachten?

Sie dürfen Livocab-Augentropfen nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Levocabastin oder einem der anderen Bestandteile von Livocab-Augentropfen sind.

### Schwangerschaft

Untersuchungen an Tieren haben keine Hinweise auf schädliche Wirkungen für die Entwicklung des Embryos oder Feten ergeben. Es liegen jedoch keine Erfahrungen beim Menschen vor. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie Livocab-Augentropfen daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden. Während der ersten drei Monate der Schwangerschaft sollten Sie Livocab-Augentropfen nicht verwenden.

### Stillzeit

Während der Stillzeit können Sie Livocab-Augentropfen anwenden, falls Ihnen Ihr behandelnder Arzt nichts anderes rät.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Livocab-Augentropfen

Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Nehmen Sie die Kontaktlinsen daher vor dem Eintropfen heraus. Setzen Sie diese erst 20 Minuten nach dem Eintropfen wieder ein.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt.

## ❸ Wie sind Livocab-Augentropfen anzuwenden?

### Art der Anwendung

Tropfen Sie Livocab-Augentropfen in den Bindehautsack ein. Bitte gehen Sie so vor:  
Schütteln Sie die Flasche vor jeder Anwendung.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, verwenden Sie Livocab-Augentropfen bitte so:

Dosis	Alter	
	Kinder ab 1 Jahr	Jugendliche / Erwachsene
Einzel dosis	1 Tropfen	1 Tropfen
Normale Tagesdosis	2 Tropfen	2 Tropfen
Maximale Tagesdosis	4 Tropfen	4 Tropfen

Die Angaben gelten für jedes Auge

Die Zeitdauer zwischen zwei Anwendungen wird durch die Wirkung von Livocab-Augentropfen bestimmt. Verwenden Sie Livocab-Augentropfen bei den ersten Zeichen einer allergischen Reizung der Bindehaut. Damit erreichen Sie die besten Behandlungsergebnisse.

Wenn die empfohlene Dosierung nicht ausreicht, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art, Dauer und Verlauf der Beschwerden. Sie müssen keine zeitliche Beschränkung berücksichtigen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Livocab-Augentropfen zu stark oder zu schwach ist.

Wenden Sie Livocab-Augentropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### 🔍 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Livocab-Augentropfen Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
<b>Selten:</b>	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Gelegentlich kann es vorübergehend zu einer leichten Reizung der Augen kommen.

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

#### 🔍 Wie sind Livocab-Augentropfen aufzubewahren?

Nach Anbruch dürfen Sie Livocab-Augentropfen noch höchstens 4 Wochen verwenden.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

#### 🔍 Woraus bestehen Livocab-Augentropfen?

Der Wirkstoff ist Levocabastin (vorliegend als Levocabastinhydrochlorid).

1 ml Suspension enthält 0,5 mg Levocabastin entsprechend 0,54 mg Levocabastinhydrochlorid oder ca. 33 Tropfen.

1 Tropfen enthält etwa 0,015 mg Levocabastin.

Sonstige Bestandteile:

1 ml Suspension enthält 0,15 mg Benzalkoniumchlorid, 0,15 mg Natriumedetat (Ph. Eur.), Propylenglycol, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat 1 H<sub>2</sub>O, Hypromellose, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke.

#### 🔍 Wie und von wem sind Livocab-Augentropfen erhältlich?

Livocab-Augentropfen sind in Packungen mit 4 ml Suspension ohne Rezept in der Apotheke erhältlich.

**Von:**  
McNeil GmbH & Co. oHG  
53587 Bad Honnef  
Tel.: 02224 / 774 0, Fax: 02224 / 774 152

**Hergestellt von:**  
Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30